



G2014/B

VOL. 1, PART 3

VOL. 1, PART 4

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON



ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

ADVERSARIA...



incomplete.

V4

LONDON MEDICAL SOCIETY

ADVERSARIA

MEDICO PRACTICA.




VOLUMINIS I. PARS III.

L I P S I A E

APUD HAEREDES WEIDMANNI ET REICH

MDCCLXX.






I.

Differtatio de evolutionibus corporis animalis sani et aegri in universum.

Corporum naturalium indoles ab attentis scrutatoribus magna cum cura indaganda est, ut ejus consideratio in usus et commoda vitae converti queat. Quando autem eorum genesis obscura, fabrica partium minimarum sensu non attingenda et mixtionis ratio, per resolutionem naturalem et artificialem indaganda, fallax admodum est, phaenomena incrementi et decrementi hac in re potissimum observari debent. Inprimis autem difficilis haec observatio ad medicos pertinet, cum non tantum in corporis humani incremento et conservacione recte dirigenda, sed etiam in morbis dijudicandis ad singulares has naturae universae mutationes respicere teneantur.

Ab eo tempore, quo novum variolarum systema, ab Ill. HAHNIO inventum et declaratum, examinavi, non solum ad varias evolutiones corporum animalium attente respexi, sed eas etiam cum vegetabilibus comparavi, in quorum fabrica et mix-



tione luculentiora phaenomena me detecturum esse arbitrabar, inprimis si ex his ad initia regni mineralis essem ductus. Primae ideae in me natae sunt, cum evolutionem vasorum in morbo varioloso cum plantarum partibus, subinde evolutis, compararem et meas dubitationes super hac re cum Ill. HAHNIO communicarem. Etsi vero haec contemplationis initia exigua erant et maximam partem incompleta, ideoque universi systematis evolutiones inde non dijudicari poterant; etsi ubique hypothesis seductus, magis in ignorantia rerum, quam in earum vera cognitione confirmabar, illa tamen idea semel excitata nunquam prorsus ex animo excidit. Suppressas saepius et inutiles mihi visas cogitationes contemplatio naturae denuo resuscitavit.

Itaque hac idea commotus, anno 1755. in prolusione academica demonstrare annisus sum, ex pathologia physiologiam explicari et posse et debere: cui eodem anno prolusionem aliam, de natura fibrae animalis elasticae per ejus genesin in morbis declaranda, subjunxi. Quanquam vero haec res ampliolem longe tractationem, repetitis observationibus illustratam posceret, quam qualem ego, tum aliis laboribus impeditus, vix incipere, nedum absolvere poteram, iis tamen cogitationibus ductus,
paullo



corporum, minime vero ad mutationes continuatas explicandas idoneum judicasse, operae pretium duxi, in hac universali tractatione, quae sit notio evolutionis verbo subjecta a nobis, paucis enarrare et postea de ratione observationum per partes tradendarum exponere.

Incrementum corporum naturalium non solum, sed etiam mutationes in conservatione et continuata genesi observandae in universum ita comparatae sunt, ut id, quod involutum est, se evolvat. Genesis salium, gemmae arborum et mutationes foetus animalis, ejusmodi evolutiones in triplici naturae regno fieri satis docent. In his omnibus minimae fluidorum particulae evolvuntur et coordinantur. Et quemadmodum ideae, in mente hominum natae, dicuntur evolvi et in morali et politico hominum statu res tectae omnes in successivis mutationibus se evolvunt et melius cognoscuntur, sic haud obscurum fore arbitror, si mutationes omnes, in vita animali evenientes, saepe tectae, per phaenomena tamen nobis patefactae, ad evolutiones referantur et ex his dijudicentur.

Evolutio igitur in corpore humano est successiva partium fluidarum et solidarum mutatio, quae in incremento, conservatione et destructione ejus animadver-

advertitur et, cum motus reciproci in minimis non satis pateant, actio ipsa tantum ex effectibus cognoscitur. Haec evolutionum ratio non solum ex mutationibus foetus in utero et ex continuato corporis incremento usque ad vicesimum annum evidens est, sed in continuatis quoque corporis mutationibus ulterius cernitur. Quamquam enim universalis evolutio, cum incremento conjuncta, post vicesimum annum subsistere videtur, particulares tamen, quae semper etiam ad universam corporis conservationem ducunt, sine intermissione efficiuntur. Nam senile etiam corpus, in quo evolutiones naturales ex parte cessant, vel languidius efficiuntur, contrahitur, de novo involvitur et densius compingitur. Quod si igitur evolutionis verbum ita usurpo, ut generalem illam corporum animalium in genesi, incremento et mutationibus vitae continuatae reliquis et denique in decremento exprimat, id non temere adfirmasse mihi videor. Non dissiteor quidem, inesse huic verbo aliquam obscuritatem, verum ista ex rei ipsius obscuritate pendet, quam a priori, ut dicunt, per hypotheses, a posteriori per phaenomena declaramus.

Equidem in hac re disquirenda non omnem ambitum doctrinae emetiri, neque genesin et evolutiones omnium corporum naturalium definire au-



deo, probe mihi conscius limitatae meae hoc in genere cognitionis, sed abstrusas has res disquisitionibus exercitatissimorum virorum lubenter relinquam, et mihi gratulabor, si omnem nexum operationis naturae, in eorum libris recte descriptum, intellexero. Nolui tamen oblivioni tradere eas observationes, quae ad hanc rem facientes, mihi, phaenomena in mutationibus morborum attendenti, innotuerunt. Praemissis itaque paucis animandversionibus, de evolutionibus in sano corpore evidenter conspicuis, rationem observationum in morbis iis convenientem simul propositurus sum, ita quidem, ut exempla mihi cognita in separatis hac de re tractatibus proxime exhibeam, periculum facturus, an particulares conclusiones elicere inde queam. Neque vereor, ne haec tam difficilis doctrinae initia a quopiam vituperentur, cum plane persuasum habeam, nec me unquam, nec eos forte, qui easdem observationes post fata mea persequuntur, ad universales conclusiones esse perventuros.

Quoniam vero corpus humanum ex solidis et fluidis partibus compositum est, phaenomena, quae nos instruunt, partim in fabrica solidorum, partim in mixtione fluidorum attendenda sunt. Etsi autem ob rerum copiam distinctim observari debeant, ta-
men



men cum in perenni nexu actionum corporis in se invicem agant, attentio in unam rem potissimum conversa, ad alteram simul dirigenda est. Perlustremus praecipua physiologiae capita et videbimus operationes naturae apertas, quae nos ad tectas in sanitate et morbo definiendas demum ducunt.

Alimenta suo modo naturae et artis ope praeparata masticando non solum comminuta, sed etiam per varios liquores soluta et motu peristaltico subacta et propulsa in chymum mutantur, ex quo chylus fugi et per sua vasa duci potest. Chylus itaque ex alimentis evolutus, accessione humorum digredientium jam aliqua ex parte assimilatus, subtilissimae et in corpore jam elaboratae lymphae ita admiscetur, ut, si etiam maximam partem vegetabilis indolis esset, in animaleam jam naturam mutatus deprehendatur. Ille vero in transitu per pulmones denuo evolvitur, quo globulis cruoris, in hoc viscere quoque resolutis et conquassatis, admisceri et hac ratione ac motu sanguinis per totum corpus praecipue in musculis in aequalem mixtionem involvi possit. Ex sanguine tamen, ut humore corporis universali, evolutiones in variis humorum secretionibus non solum efficiuntur, sed porro etiam aliae et longe nobiliores in elaboratione lymphae et inde



pendente nutritione, porro quoque in elaboratione fluidi nervei et inde pendente vigore animali animadvertuntur. Ex his omnibus tandem continuatae et operosae actiones in conservatione et incremento corporis animalis intelliguntur.

Etsi autem haec humorum elaboratio in physiologia abunde declaratur et pro instituti ratione non satis accurate a me repeti potest, brevis tamen tractatio, quae evolutionis ideam in universum tradit, rei illustrandae omnino infervit et nos ad ulteriorem considerationem in pathologia et therapia ducit. Globuli nimirum sanguinis in sana et aequali circulatione per totum corpus, imprimis per pulmones et musculos recte elaborati, in progressu per vasa minora, causis varie applicatis, per fabricam solidarum partium potissimum, quanquam obscure declarandis, ex mixtione sua ita evolvuntur, ut in motu continuato non tantum humores secernendi et suo modo ex corpore eliminandi, sed etiam alii in nutritionem et vigorem corporis convertendi secedant.

In varia hac humorum corporis animalis elaboratione molecule ceu globuli, ex quibus fluida nova componuntur et evolvuntur, in novas ubique mixtiones transeunt. Ex intima enim particularum
fluidi

fluidi separatione et combinatione, non tantum omnis secretionum ratio intelligitur, sed praecipue lymphae et fluidi nervei elaboratio, ex qua universi corporis vis pendet, cognoscitur. In differentiam humorum secretorum inquirere, ab instituto nostro alienum sit; de lymphâ tamen et fluido nerveo, ut humoribus universalibus, nonnulla addere, non supervacaneum habeo.

Gelatinosae plus minus densae et pingues partes in sanguine dispersae non protinus ad nutrimentum fibrarum applicari possunt, sed in systemate cellularum, vasorum lymphaticorum et glandularum conglobatarum novam evolutionem subeunt, postquam in universum humorum circulum redeunt et ex eo ad varias partes solidas, earumque fibras minimas, delatae, varia ratione formantur, apponuntur et assimilantur, ut corpus conservetur ac suo modo crescat, semper tamen in robore elastico confirmetur. In his tamen minimis partibus, alia evolutio et destructoria quidem separatio minimarum quarundam particularum in sanis aequè ac aegris attendenda est: gelatinosae enim particulae non nisi in spatia a secedentibus particulis relicta apponuntur et figuntur. Singularis denique et operosa in encephalo efficienda elaboratio, fluidum aliquod subtilissimum evolvit, quod
per



per nervos in univcrsum corpus diffunditur et vim corporis vitalem, fenfu et motu potiffimum conſpicuam, efficit.

Ex iis itaque, quae nunc tradidimus, manifeſtum eſt, evolutiones, in ſano potiffimum corpore attendendas, ad ſequentia capita redigi poſſe.

1. Evolutio nutrimenti ſumpti in digeſtione, quod in chyli et ſanguinis elaboratione denuo involvitur.
2. Evolutio ſanguinis in ſecretionibus et aliis humorum elaborationibus, in lymphae ceu humoris nutrientis elaboratione rurfus involuta.
3. Evolutio lymphae vario modo ad ſolidas partes adaptandae, quae in ipſa applicatione et conjunctione cum fibris in eorum naturam quaſi involvitur.
4. Evolutio fluidi nervei obſcura quidem, attamen in univerſo corporis vigore per ſenſum et motum declarata, ut in ea ſumma vitae animalis praefantia cernatur.

Hae ſunt evolutiones univerſales, in quibus multae particulares v. c. bilioſa, ſpermaticea cet. vel ſi ſpectes partes ſolidas, geneſis et confirmatio offium ſimul eveniunt, fuſius tamen a nobis in hac commentatione examinari non poſſunt.

Equi-

Equidem nec novam physiologiae docendae methodum stabilire, nec vocabulum evolutionis ad omnes corporis animalis mutationes explicandas transferre volo, nec in pathologico therapeutico doctrinis docendi rationem priori superstruere audeo; specimenibus tamen propositis, ostendam, quomodo in mutatione corporis morbosa ad has sanas corporis evolutiones redire et observationes motuum universalium in corpore humano accidentium, per phaenomena, ad hanc normam disquisita colligere studeamus.

Quaquam autem sanitas, oppositum plane statum, morbum refert distinctio in evolutiones sanas et morbosas recte locum habere videtur, tamen cum quilibet sanus subinde ad morbos disponatur et in aegro quoque ad sanas evolutiones respiciendum sit, observatio motuum universalium in sanitate et morbo nos semper ad mixtas evolutiones attendere jubet, ut vires vitae et morbi rite discretas inter se conferamus. Dum enim sanum corpus per vires solidarum partium elasticas et vitales fluidas particulas movet, evolvit et vario modo disponit, acres et viscidas vel alio vitio noxias futuras simul circumducit, resolvit et expellit, quo sanitas conservetur. Hoc non solum excretiones solitae
alvi,



alvi, urinae et sudoris sive perspirationis, sed et salivialis, mucoſa, bilioſa et rariores aliae v. c. lacrymalis et ceruminofa in oculis et auribus ostendunt. Diarrhoea ſeroſa et bilioſa, urina, in qua crassa ſubſident, perspiratio in ſudore nonnunquam foetido aucta, in vita ſana ſaepius morbos imminentes tollunt; ſimili modo ſalivae, bilis et mucii in variis viis evacuatio copioſa, morbos tranſitorios vix perceptos, effectu tamen ſalutares ostendit. Elaborationes ſanguinis et lymphae, quae variis et vehementioribus ſaepe exercitationibus corporis et animi pathematum motibus in vita communi valde turbantur, in hominibus tamen nulla particulari viſcerum et organorum labe affectis, ſaepius reſtituuntur et interdum non ſine commodo.

Quemadmodum vero in tuenda ſanitate ad clandestinam morbi geneſin reſpici oportet, ſic in morboſis quoque evolutionibus ad ſanitatem attendendum eſſe intelligitur. Motus febriles, qui in vario corporis ſtatu incitantur, hoc evidentiter evincunt. Febris digeſtionis ceu concitator motus ſanguinis poſt paſtum ſanguificationem efficit et juvat. Vehementiores ſunt motus, ſi magna chyli vis adducta fuit, ex vini potu largiori augetur febris et corpus incandescit et ſi ebrietas inde nata viam nervoſam
ſuf-

sufflammat et frangit, motus febriles quidem cohibentur, sed ingratus aliquis languor succedit. Quot febres sunt catarrhales transitoriae, in quibus corpus, ubi perhorruit, incaluit et sudavit, sanitati restituitur. Ex his levioribus mutationibus graviorum febrium intermittantium et continuarum ratio omnino apparet; in his enim, ratione diversorum paroxysmorum, recte procedentibus, etsi nonnunquam graviora symptomata accedunt, vigor corporis seu sanitas superstes evolutionem juvat et dirigit, et per has tandem ad secretiones salutare praeparat.

Has febres, quod cum symptomatibus non admodum gravibus incedunt, semper ferme benignas appellare possumus; quando vero refractaria mixtio materiae morbosae, copia sanguinis et humorum difficulter movenda; quando a materia, quae motu nimio acris facta est, spasmi excitantur; quando et eadem materia, singulari ratione nervis infesta, languorum et, quod pejus est, celeris prostrationis virium causa est, tum evolutiones, a naturalibus auctis non magnopere diversae, ita turbantur, ut symptomata molesta et difficilia attentionem medici in evolutione dirigenda quam maxime perturbent. Quamquam vero enumeratae causae tristem saepius morbi progressum et finem faciunt, tamen et remedium



diorum imprudens applicatio magis nocet, ita ut spontanei naturae motus non tam periculosi sint, quam quæ ab erroribus aegri et eorum, qui curam hujus fuscipiunt, derivantur. Prudens itaque medicus et tum, cum tristes materiae evolvendae perturbationes variis de caussis accidunt, non nisi at-tenta evolutionum sanarum contemplatione ad auxilium aegro ferendum idoneus evadit.

In systemate seroso lymphatico similes evolutiones evenire dubium non est. Hæc vero vel lente tantum in morbis chronicis procedunt, vel interdum, febre tandem accedente, vehementius absolvuntur. In cellulis tamen et glandulis lymphaticis, quibuscum vasa, subtiliores humores vehentia, conjuncta sunt, materia morbi difficulter subigi potest et mutari. Materia certe in viis minimis nimis evoluta et subtilifata ad vias excretorias non ducitur, sed in corpore diu subsistit, ibique vel lente multiplicatur, vel etiamsi tantum quiescit, viribus corporis solis non amplius mutatur et expellitur, sed efficacem postulat medicinam. Hac enim humores universi resoluti tandem ad systema sanguineum et inde ad colatoria organa transferuntur, quod sæpe sine gravi corporis noxa effici non potest, imprimis si mala materia solidis ipsis inhaereat et eorum vires elasti-

elásticas et vitales infringat. Summa itaque medici attentio exigitur, si miasmata chronica maligna evolvi, mutari et expelli debeant. Hujus evolutionis morbosae per prudentem medicum dirigendae exempla, in atrabiliaris et hypochondriacis, arthriticis, scorbuticis et venereis morbis potissimum invenienda et ulteriori observatione definienda, suscipiamus.

Cum fluidum nerveum sit humor subtilissimus, ex sanguine secretus, mira tamen ratione per nervos in totum corpus diffusus, in evolutionibus reliquis sanis et morbofis solidarum et fluidarum partium, ejus vis vel aucta vel imminuta attendenda est, quo minimarum fibrarum actio in motibus omnibus dirigendis ex effectibus dijudicetur. In ipso tamen hoc fluido elaborando et per corpus duccendo, singulares saepe et mirandae existunt evolutiones, quae cum natura ejus valde obscura sit, etiam difficulter investigantur et declarantur. Sopores et spasmi, vel ut symptomata in variis morbis accidentia, vel ut morbi ipsi habituales oriundi et permanentes, hoc satis indicant, quibus si deliria melancholica et maniaca addideris, maxima rerum observandarum copia offertur.

Quanquam vero et in aliis evolutionibus propter intimam particularum et sanarum et morbo-



farum mixtionem in fluidis et propter subtilissimam fabricam in solidis, haud exigua obscuritas nos saepenumero confundit, illa tamen in nervorum motibus observandis maxima est, et praevidemus omnino, observationes et explicationes phaenomenorum, non nobis tantum, sed futuri quoque seculi doctoribus difficillimas et profecto impossibiles futuras esse. Nihilo tamen minus nostrae partes sunt, et hac in re omnia phaenomena in morbis conspicua caute observare et inter se conferre, nequaquam vero protinus ad hypotheses stabiliendas trahere, sed tantum variis systematis medici capitibus adjicere et iis tandem, qui nos sequuntur, conclusiones inde eruendas committere. Quoniam vero haec omnia non ad historicam tantum rerum medicarum cognitionem, sed ad ipsam medicinam faciendam transferenda sunt, nocentium et juvantium indoles tentaminibus eruenda est, quae quidem res non ad absolutam, sed limitatam magis therapeuticae cognitionem ducit.

Disquirendum autem est, cur evolutionis ideam, quae primum ad solidas partes transferenda erat, ad fluidas praecipue partes transtulerim ita, ut omnis ratio mixtionis in syncrasi et diacrasi humorum per eam unice declaretur? solidarum profecto partium

evolutio non intelligi potest, nisi ex motu fluidorum, per quem non solum nutritio et conservatio partium, sed eorum etiam incrementum dirigitur. Motus nimirum fluidorum per vasa et progressivus et intestinus et ex hoc potissimum pendens elaboratio succi optimi gelatinosi et extensionem vasorum et appositionem novarum particularum efficit, quae major est in molli et juniore aetate, hinc incrementum; aequalis in media aetate, hinc conservatio; minor in senili aetate, inde contractio corporis. Quae autem hac ratione per varia vitae stadia procedere debebat evolutio, multis modis turbatur, diæta minus recte observata, atque inprimis tum, si in ea neglecta morborum universalium causa latet. Possunt tamen et hic de inaequali corporis incremento et vigore causae indagari, ex quibus varia evolutionis ratio explanetur.

Quanquam vero hoc in fabrica omnium partium solidarum et in earum continuata nutritione perspiciatur; sanatio porro vulnerum et coalitio in cicatrice, non nisi nutritioni analogae est, denique in variis morbis fungosae carnis genesis et induratio callosa membranarum subinde extensarum similia phaenomena offert, nusquam tamen evolutionis ratio facilius, quam in ossium incremento apparet.



In cylindricis nimirum diaphysium elongatio et epiphygium apta conformatio, in planis extensio striarum ossæarum a medio ad ambitum, veram ossium evolutionem in statu naturali luculentis phaenomenis declarat. Neque vero minus in morbofis ossium exostosis, in fractorum coalitu et formato callo, similis novarum particularum ossæarum evolutio animadvertitur.

Quando autem in morbis febrilibus non solum cacochymiae per diaetae peccata collectae v. c. viscida, rancida; cet. evolvuntur et suo modo subiguntur ac expelluntur, sed specificae quoque putridae, variolosae et aliae ad summam et contagiosam subtilitatem exaltatae, generantur, medicorum attentio nec in his debet desiderari. In tanta quidem mixtionis particularum subtilitate semper et ubique obscuritas nullo modo discutienda apparebit, symptomatum tamen universalium ratio nonnulla signa subministrabit, ex quibus, etiamsi non causae primae, certe tamen effectus elucescunt, qui in cura morborum usu suo non deslittuntur, sed argumenta, a similitudine desumpta, certiora et ad applicationem medicamentorum idonea reddunt.


Omnia haec de evolutionibus fluidarum et solidarum partium doctrina, quae ad universum systema

ma medicum spectat, spissis quidem tenebris involuta latet, nec nisi attentos naturae indagatores commovet. In minimis sensui non facile obviis partibus evolutio absolvitur, nec unquam rite dijudicatur, nisi ex una parte causae agentes universales, ex altera effectus, per phaenomena patentes, recte annotentur, annotataque saepius examinentur. In hac re itaque detegenda duplex via nobis patefacta videtur: aut enim in causas primum inquirendo ad effectus progredimur, quae via recta, etsi in obscuritate causarum primarum difficillima est; aut ab effectibus ad causas regredimur, quae quamquam inversa via est, tamen cum in luculentis phaenomenis incipiat, optima semper iudicanda est.

Etsi vero in tanta rerum difficultate finem nostrum non attingimus, industriam tamen et operam, ad hanc rem impensam, non sine fructu fore speramus. Dum enim modum evolutionum observandarum in variis exemplis tradituri sumus, consilium nobis est, doctrinae nostrae alumnos ad similem ex hoc genere industriam excitare. Ita enim facile perspicient, quam necesse sit, in omni morborum examine, actiones hominis sani et aegri comparare; et quemadmodum in scholis pathologia et



therapia per physiologiam illustratur, sic denique phaenomena morbi et mutationes sanationis naturam, in sano corpore agentem, ostendent. Cognoscant cautam hypothesium explicationem, quibus quidem res physica et medica carere nequit, ita tamen ut res, quae non semper certo possunt doceri, ad probabilem conjecturam transferantur, quae tamen semper conjectura manet, nisi per nova collecta phaenomena amplius declaretur. Cum denique omnis cognitio medicinae in motuum animalium directione posita sit et consilia diaetetica et auxilia pharmaceutica, quatenus hos motus in evolutionibus consuetis et satis cognitis mutant, attendi debeant, quo vis consilii et auxilii recte intelligatur, medicina practica ultimum et praestantissimum usum inde percipiat, selectus enim remediorum non coeco ausu, sed ex veris artis principiis instituat, necesse est.



II.

Commentatio de morbo et morte amatae
conjugis mense decembri 1767. con-
scripta.

Dolor acerbus, quem mors amatae conjugis ante tres menses mihi excitavit, nondum sopitus est, potius, non nihil suppressus, vivide recrudescit, cum ea, quae ad rem medicam illustrandam faciunt, ex adversariis meis super hac re eruere cogito, quo confuse et anxie conscripta, quodam modo in ordinem redigantur. Equidem praevideo, nec exercitatos medicos, ideoque nec artem medicam in universum, ex hac, quam exhibeo, descriptione insignae doctrinae augmentum, nec illustrationem accipere posse, quod omnia auxilia, in gravi morbo incassum adhibita sunt, et perversus, qui sectione tandem detectus est, intestini coli situs atque expansio, ut morbi et mortis causa proponenda jam multis aliis observationibus declaratur; sed in hac re describenda et mihi et Vobis, Amici optimi, memoriam charissimae Ludwiggiae, quam tristem, renovare et doctrinae nostrae alumnis exemplum tradere volui, quomodo medendi methodum et tum, cum omnia auxilia irrita sunt,



ad normam medicinae rationalis dirigere et disquisitiones anatomico practicas in perverso partium situ, accurata perlustratione ducti et de vero partium situ instructi, recte absolvere debeant.

Sophia Regina Ludwigia, nata est die 18. augusti 1726. Etsi autem die nono aetatis matre orbata est, tamen educatio, quoad animum aequae ac corpus, ad sextum usque annum, constitutioni utriusque accommodata erat. Ab eo autem tempore sollicita corporis et animi cura maxime neglecta et nostra ad labores aerumnosos corporis viribus majores adstricta est. Quanquam autem hac vivendi ratione corporis incrementum non penitus retardatum est, tamen, cum victus non semper digestionis viribus responderet, in flore aetatis adolescentis imbecillitas quaedam, cum cacochymia conjuncta, oborta est. Accidit autem felici eventu, ut anno aetatis decimo quinto a matris sorore exciperetur, quae ulteriorem ejus educationem sapienter direxit, hujus enim cura factum est, ut vires languidae quodammodo reficerentur, quibus confirmatis, non solum variolas et morbillos prospere superavit, sed et in aliis morbis, cum exanthematibus conjunctis, quibus cacochymia nonnunquam corrigitur, vita ejus conservata et sanitatis vigor maximopere restitutus est.

Deci-




Decimo octavo igitur aetatis anno, morbis his superatis, humoribus correctis et aliquo partium solidarum robore inducto, recte convaluit, quibusdam tamen imbecillitatis signis a neglecta antea bona educatione relictis. Cum itaque ad annum vicecimum accederet, mihi nupsit et secundo matrimonii anno filium vegetum et sanum peperit, etsi gravida ob morbum meum periculosum animo non parum afflicta erat. Ab hujus filii lactatione ob uberiores lactis affluxum, quo debilitata est, abstinere cogebatur. Sed ab eo jam tempore haud raro de tensionibus abdominalibus praecipue in regione ventriculi conquerebatur et simul ex alvi feignitie varia incommoda patiebatur, quae tamen incommoda et potui calido, quem prae frigidiusculo amabat et habituali intestinorum angustiae adscribebam, inprimis cum a variis medicamentis purgantibus, constitutioni corporis accommodatis, parum moveretur et juvaretur.

Quae postea sequuta sunt puerperia, minus felicia erant, quod praeter imbecillitatem naturalem continuis ferme infimi ventris spasmodis, quibus tentabatur, adscribebam. Angebant illam praeterea curae domesticae, cum in morbo diuturno et morte primogeniti filii noctes saepe insomnes transigaret



ret et, nimis saepe timida, animum et corpus defatigaret. Quinque igitur sequentes filios vel sexto vel septimo graviditatis mense edebat et in graviditate ipsa, in puerperio et in servando uno septimestri partu multis morbis usque ad septimum annum agitato, ita semper depressa est, ut verum corporis vigorem nunquam recuperare posset. Vix enim annus erat, in quo non haemorrhagiis uteri et saepe gravissimis febribus anomalis aliisque morbis tentaretur. Vicit tamen haec omnia usu parco selectissimorum remediorum, apto diaetae regimine ac tranquillitate animi, et inter magnas curas domesticas ita tamen conservata est, ut ultima graviditas, quae in annum aetatis tricesimum primum incidebat, felicissime ad iustum terminum duceretur. Filium enim peperit sanum viresque et in graviditate et paulo post, inprimis corticis Peruviani crebro usu adjuncta, sustinuit, ita ut et ejus educationem, ob morbos saepius accedentes, difficilius ad decimum usque aetatis annum dirigeret, ipsumque sub initium hujus anni, ex celeri corporis incremento graviter laborantem sua cura servaret, vigiliis nocturnis saepe detenta miserum aegrum, ipsa saepe aegrotans tamen in sinu foveret. Et profecto charissima matrimonii nostri pignora,
duo



duo filii superstites, qui de obitu matris praematureo mecum lugent, non vitam tantum, sed conservationem quoque vitae, praeter Dei providentiam, optimae huic matri debent.

Ipsa vero, ut per totam vitam semper imbecillis et ad morbos proclivis erat, sic praecipue in ultimis sex vitae annis continuis ferme anxietatibus, quae saepe animi tristitiam et moerorem hypochondriacum inducebant, agitata est, ita tamen, ut animi constantiam, in tristi morbo conservatam, virtute et religione confirmaret. Augebantur hae anxietates tum praecipue, cum alvus non recte respondebat, validisque saepe medicamentis purgantibus non moveri poterat. Salium saepe sat magna dosi sine fructu usa est, quae ob summam, quam intestinis inducunt relaxationem, crebrius propinari non poterant. Aqua igitur amara Seydschützensis, qua alvus in aliis facile movetur, inprimis si vesperi pilulae gummi saponaceae praemittantur, saepe illam prorsus non, saepe parum movit. Nec clysmata semper speratum effectum edebant, quam ob rem aestate superiori fel taurinum recens ad drachmam unam et alteram immo interdum ad unciam semis cum aqua cinnamomi sine vino crebrius et quotidie ferme sumfit et alvus inde cum levamine soluta est.

Cum



Cum enim utplurimum foeces non satis tinctae, sed tenaces et quasi argillaceae essent et bilis inertiam vel defectum proderent, hoc auxilio potissimum utendum erat.

Hieme utplurimum melius se habebat amata mihi conjux et rarius anxietates has hypochondriacas sentiebat, alvus etiam melius respondebat, appropinquante autem vere, magis anxia reddebatur, alvo simul sicciore. Ad hanc lubricandam saepe per aliquot menses lac caprillum aliquoties et asininum potavit, sed sine fructu, cum alvus et tunc ficcior esset. Balneis Lauchstadiensibus anno sexagesimo quarto et quinto quodammodo adjuncta est, motus autem in aëre libero et frictions infimi ventris in balneo, quibus tensiones reprimebantur, plus commodi praestitisse opinor, quam vim balnei roborantem. Ideo etiam aestate superiori saepius ruri commorata est, quo exercitatione corporis in aëre liberiore reficeretur, saepe enim per horam et ultra sine defatigatione et cum vero refectiois sensu obambulavit.

Variis itaque his causis, eam laedentibus et per tot annorum decursum corpori applicatis, debilitata conjux charissima ad hunc annum, qui quadragesimus primus vitae erat, satis tamen vegeta accessit,
ut

ut negotiis domesticis accurate, uti semper fecit, praesse posset, sub initium aestatis vero tristitia debilitatis nervorum symptomata sensit, anxietates nimirum crebriores, sicca saepius et tarda alvo. Foeces ob inertiam bilis argillaceae, tenaces, tensiones abdominales, imprimis in hypochondriis, crebriores, continuas ferme molestias efficiebant et quanquam lenia laxantia, bilis bovinae usus, clysmata et carminativa quaedam medicamenta interdum levamen afferebant, hoc tamen exiguum erat.

Die vicesimo augusti, multis curis domesticis recte superatis, vesperi in rus abiit, pedestri itinere unius circiter miliaris sine magna defatigatione absoluto, quod tamen somnus, ut saepe accidebat, minus tranquillus sequebatur. Die sequenti in sinistro latere ad flexum intestini coli sub liene dolorem paullo acriorem sentiebat, transitorium tamen, ita ut pulverem ex terreis antacidis nitro et castoreo, quem ei offerebam, sumere recusaret et die vicesimo secundo augusti quoque negotia domestica curare ac sine ulteriori doloris sensu in horto obambulare posset. Parcum sed bonae notae cibum hac die sumebat et potu ordinario aquis scilicet Selteranis parce utebatur, nox etiam satis tranquilla erat.

Die



Die sequenti tempore jam matutino magis anxiosa, de alvo obstructa ac doloribus sinistri lateris iterum conquerebatur et ob auctas abdominis tensiones incurvo non nihil corpore incedebat. Circa meridiem accedebant nonnulli amici, quos hilari vultu excipiebat, iisque praesentibus dolores abortos celare annitebatur. Ego vero illi persuadebam usum clysmatis, quo foeces quaedam durae et tenaces secedebant, ut tensiones infimi ventris non nihil remitterent, ipsa vero vesperi me in urbem regredientem, ad pagum usque vicinum comitaretur et ex ambulatione levamen aliquod percipere videretur. Sed cum inde in villam reverteretur, dolores abdominis imprimis sinistri lateris longe majores sensit et per totam noctem iis excruciatam est, cum epithematibus calidis crebro applicatis levare haud possent. *) Summo mane clysmata postulabat et primum quidem nonnulla scybala duriora removebat, reliqua vero nec flatus discutiebant, nec dolorem sopiebant.

Curru itaque lente in urbem vehebatur, ne concussionibus dolores ventris intenderentur, et die vicesimo quarto augusti hora quarta promeridiana,
con-

*) Forte frigida profuissent epithemata, quae robur extensis intestinis reddidissent, sed et haec applicata sine fructu fuisse, eventus morbi declaravit.

continuis doloribus tentata, incurvato corpore in
 meos amplexus ruebat, tristem hujus morbi exitum
 sentiens, et a me, si quod esset, solatium expetebat.
 Suasi quietem in lectulo et mox propinavi salis Sedli-
 censis amari unciam semis et quo alvus eo certius
 moveretur, clyfma ex fumo herbae nicotianae ap-
 plicari jussi, sed incassum. Data igitur hora septi-
 ma altera semiuncia salis amari, cataplasma discu-
 tiens et emolliens ad dolores sinistri lateris potissi-
 mum sopiendos ventri usurpavi. Nox erat minus
 tranquilla. Cum igitur hora secunda matutina au-
 xilium meum iterum efflagitaret, tartari vitriolati
 duas drachmas ei propinavi, clyfma carminativum
 suasi et post aliquot horas iterum dosin salis amari
 exhibui, cum et antea interdum continuato usu hu-
 jus remedii alvus mota esset. Ob doloris et spasmi
 vehementiam venaesectione levamen afferre cogita-
 bam, sed imbecillitas eam dissuadere videbatur.
 In auxilium itaque vocavi amicos medicos, qui ex
 pulsu, nec nimis celeri, nec forti concludebant, ve-
 naesectionem minus necessariam esse.

Quod autem, medicamentis hucusque exhibitis,
 alvus non movebatur, aegra bilis bovinae cochleare
 unum et post aliquot horas alterum fumebat, hoc
 remedio enim alvus, antehac saepe pertinaciter ob-
 structa,



structa, soluta est, sed et nunc effectus votis non respondebat. In prandio tenue jusculum cum halica ex fagopyro et aqua Selterana pro potu exhibita sunt et cum salium usu continuato nimia partium laxitas induceretur, neque tamen his foeces nimis tenaces resolverentur, singulis duabus horis mixturae ex tartari tartarifati drachmis duabus, extracti centaurii minoris drachma una, aquae menthae sine vino unciis duabus et uncia femis aquae cinnamomi sine vino parata, ad cochleare unum et alterum propinabatur et simul clysinata ex fumo herbae nicotianae continuata sunt, sed sine fructu.

Die 26. augusti aegra desiderabat remedium laxans ex pulpa tamarindorum uncia una, mannae et cremoris tartari ana uncia femis, quod alias alvum bene moverat, illudque, consentientibus amicis medicis, accepit, quanquam autem motus in abdomine excitati sunt, nulla tamen subsequuta est excretio, sed tensiones abortae versus vesperam iterum paullulum conquiescebant, imprimis cum cucurbitulae et vitra aëre rarefacto repleta abdomini applicarentur et ita intestina flatibus distenta paullulum comprimerentur. Hac nocte, quae et ipsa sine somno transiit, solutionem gummatum sumpsit, quo tenacitas foecum, salis usu non resolvenda, ad aliquam

quam fluiditatem disponderetur. Miscebatur nimirum gummi ammoniaci et galbani ana drachma una et assae foetidae drachma semis cum olei amygdalarum dulcium uncia semis et drachma una tincturae antimonii tartarifatae, addita ad solutionem melius praestandam sufficiente quantitate vitelli ovorum, his bene tritis addebantur aquae florum chamomillae unciae tres et aquae menthae sine vino uncia una, cujus mixturae unciam circiter singulis duabus horis spe auxilii confirmata sumsit aegra, etsi prorsus nauseosus esset sapor.

Die 27. augusti ante meridiem non nisi analeptica medicina adhibita est, cum animus ejus, tot cruciatibus agitato, sacrae coenae usu confirmandus esset, a meridie vero mixturae resolventi, praeterita nocte haustae, medicamentum laxans ex foliorum sennae sine stipitibus drachmis duabus, mannae optimaee et salis amari Sedlitzensis ana uncia semis, in aquae simplicis unciis tribus leniter coctum, adjungebatur, quo quidem vehementer agitata est, imprimis cum atonia ventriculi in sic dicto scrobiculo cordis et hypochondriis majorem distensionem admitteret, ex qua re anxietates molestissimae inducebantur. Omnibus his temporibus et emollientia cum oleosis et sapone et interdum discutientia



carminativa applicata sunt, sed sine omni effectu, cum, si etiam aliquid mucii, ab intestinis abradi, secederet, nullum tamen, ne minimum quidem levamen perciperetur.

Erat vero ventris tumor prorsus singularis. Regio inferior abdominis versus pubem non adeo tumebat, sub umbilico autem tumor transversus conspiciebatur, quem zona coli, e situ suo deorsum pressa, efficere videbatur, in loco zonae ipsius aliqua transversa depressio erat et in regione scrobiculi cordis et utrinque in hypochondriis super dictam depressionem, ventriculus maximopere distentus partim eminebat, partim sursum diaphragma urgebat. Intestinis itaque tenuibus parum distentis, ventriculus a mole ingestorum, zona coli autem flatibus distenta videbatur. Ventriculus vero distentus per crebras frictiones eo non deduci potuit, ut vel per cardiam, vel per pylorum aliquid dimitteret, ita ut aegra, quae inter ipsam frictionem aliquid levaminis percipiebat, nunquam ructum aliquem ederet, cum spasmio pertinaci utraque extremitas ventriculi praeclusa esse videretur. Vomitus saepe expectabamus, cum conatus vomendi, sed sine insigni nausea interdum orirentur, sperabamus enim anxietates quasi suffocativas rejecta aliqua parte contento-

rum ventriculi aliquantum initiores fore, etsi morbum inde non sanari posse praevidebamus. Nihil tamen emotum fuit, nisi lenis ructus, ex oesophago tantum ascendens et aliqua viscida particula ex faucibus expressa.

Cum hac nocte adeo excrucitata esset, sed medicamentum stimulans, nec laxans, nec carminativum propinari posset, die 28 augusti oleum amygdalarum dulcium, recenter expressum, cum vitello ovorum tritum, addito pauxillo vini hungarici generosi, per partes propinavimus. Etsi enim relaxatio major ventriculi ab oleo timenda erat, aliquid tamen in spasmo solatium et aliquam virium refectioem inde expectabamus. Tentavimus quidem antea lenia quaedam medicamenta carminativa, infusum radicis serpentariae virginianae cum aqua melissae sine vino, extractum cascarillae, cum aqua cinnamomi sine vino solutum, et alia remedia antispasmodica, horum tamen usum, ut saepe, sic hodie potissimum, negligebat aegra, cum inde nullum unquam levamen sentiret, nec ructus unquam secederet, ob summam, ut opinabamur, ventriculi atoniam. Quanquam vero ventriculus dissentus nullo modo cedebat et emplastrum quoque stomachicum, ex emplastris de crusta panis, matricali et gummi




galbano paratum et cum oleo chamomillae et galbani malaxatum sine effectu applicaretur, tamen cum hac die catamenia, quae jam ante quatuor dies expectavimus, erumperent, aliquid inde levaminis afferri posse sperabamus, sed spes quoque inanis erat, cum non nisi quaedam menstrui sanguinis vestigia apparerent.

Die 29. augusti ab hora tertia ad quintam matutinam, continuis cruciatibus hucusque defatigata aegra paullulum dormiebat, quo tamen somno nullo modo resecta est, per totum vero diem sudabat, pulsu pleno, molli magis, quam duro et perspiratione aucta, spasmi non nihil levari videbantur, ex qua re spem aliquam moti obstaculi in sinistro latere percipiebamus. Sed nox jam gravior erat et tensiones in sinistro latere iterum molestae, non tantum vehementiores redditae sunt, sed inde ad spinam dorsi deductae, ut continua frictio, qua non nihil levabatur, necessaria esset. Media nocte clyisma oleosum et versus matutinum tempus aliud cum paucis stimulo salis et oxymelle injiciebatur, quod tamen subito expulsum est et non nisi post horam viscidum sustulit.

Cum igitur spes omnis spontanei naturae conatus evanesceret, cum tot medicamenta stimulantia,
resol-

resolventia et lubricantia sine omni effectu tentata
 essent, et omne obstaculum in nimia distensione
 ventriculi et intestini coli, ob relaxationem tunica-
 rum expansi, positum esse videretur, simul tamen
 de primo obice in sinistro latere removendo cogi-
 tandum esset, medicamenta insuper, quae volu-
 men aliquod habebant, non amplius tentari pos-
 sent, cum catameniorum fluxus, qui adhuc se mon-
 strabat, leniter quidem et sine levamine procede-
 ret, heroico illo mercurii vivi auxilio, quod in hunc
 usque diem distuleramus, forte miseram aegram
 juvare posse credebamus, inprimis cum, resolutis
 viscidis et tenacissimis foecibus, ponderosum hoc
 remedium viam, si qua esset, aperire posset.
 Quanquam autem dubitari potuisset, num hoc re-
 medium in morbo, ab insigni nervorum imbecilli-
 tate oriundo et ab atonia ventriculi et intestinorum
 pendente, ullius usus esse posset, in summis tamen
 malis dubium hoc potius, quam nullum elegimus
 auxilium, inprimis cum damnum evidens, ex mer-
 curii vivi usu oriundum, timendum non esset.

Paravimus igitur die 30. augusti balneum ex
 lacte cum emollientibus herbis decocto et sapone ve-
 neto et postquam aegram imbecilem per horam di-
 midiam in eo detinuissemus, aliquoties fricato spon-



gia abdomine, hora undecima propinavimus cochleare olei amygdalarum dulcium recentis et paullo post unciam unam mercurii vivi rite destillati. Disquisito autem, hac data occasione, ventris tumore, ab umbilico et loco zonae coli depresso, versus scrobiculum cordis et hypochondria maximam et insignem prorsus ejus deprehendimus resistentiam, minorem in parte abdominis inferiore, hic enim cutis corrugari et iinus venter comprimi poterat. Continuavimus postea usum mercurii vivi et hora prima, quarta, septima et nona semper unciam unam et semis praemisso oleo amygdalarum dulcium propinavimus, in balneum autem aegra ob imbecillitatem descendere recusabat. Mercurii igitur vivi septem uncias intra decem horas deglutivit. Tota tamen hac die nihil mutatum est, sed consuetae abdominis tensiones continuabant, nec ullum postea ab hoc mercurii usu percepinus effectum, nec salutarem, nec finistrum.

Nox erat minus tranquilla, ut praecedentes omnes. Die itaque 31. augusti, amici medici de novis auxiliis cogitabant, sed aegra plura remedia renuebat, nec nos certum quoddam, obici in sinistro latere tuto opponendum, invenire potuimus. Quanquam autem moeror me et amicos tandem deprimebat, cum
perti-


pertinacia morbi, artis auxilia votis nostris minus respondere, ostenderet, quo vero officio nostro satisfaceremus, dijudicavimus varia medicamenta, indicationibus, a nobis formandis, respondentia: hinc partim de evacuantibus stimulantibus, partim de antispasmodicis medicamentis differendum erat, quod tota deliberatio in obice excretionis alvinæ removendo et in spasmo partim refrenando versari debebat.

Ad purgantia quod attinet, digestiva et salina et lubricantia sat copiose jam propinata erant, sed haec ventriculum et tubum intestinalem magis repletum, distensione nimia ad atoniam disposuerant. Drastringorum usus vix tentandus erat ob spasmi vehementiam, cum a stimulantibus, aliqua et moderata dosi additis, motus tensivi magis aucti essent, obice tamen non emoto. In nostra enim aegra et tum, cum sana videretur, parum commodi praestiterunt. Resina jalappae, vitello ovorum soluta, ad sex grana exiguum effectum edidit et cum ei ante quatuor annos intra viginti quatuor horas successive cum pilulis saponatis quindecim grana hujus resinae exhiberem, non nisi una vel altera largior dejectio subsequuta est, cum e contrario ex bilis bovinae usu, semper alvus facilior et copiosior fuisset. Cogitavimus de



auro fulminante; cujus effectum in pertinacioribus alvi obstructionibus optimus praeceptor WALTERVS adeo extollebat; sed vis ejus in varia praeparatione dubia et effectus, etsi antehac saepe tentatus, nunquam a me salutaris deprehensus erat.

Antispasmodicis forte juvari potuisset misera aegra, si succum nutritium bonum fibris infundere illasque ad suscipiendos stimulos moderatos aptas reddere licuisset, sed adeo distentae, relaxatae et debilitatae erant, ut nec flatum contrahendo exprimere possent. Et quomodo ea, quae ob imbecillitatem universalem et tum, cum sana videbatur, nutrimentum acceptum non satis elaborare poterat, nunc vere nutriri potuisset, cum nec minimam alimenti partem digereret. Relaxantia lubricantia, spasmum sopientia, exhibita sunt, sed certe noxia fuerunt, antispasmodica castoreata, succinata et olea destillata in refracta dosi ut carminativa propinata parum profuerunt. Moschum ut antispasmodicum lubenter tentassem, sed omnes amici sciunt singularem aegrae idiosyncrasiam, quod odore hujus medicamenti saepe vehementer commota erat. Opiatis insignes aegrae cruciatus diu jam levare volueramus, cum et ipsa opium posceret, sed repugnare videbatur aucta abinde febris, quam ob sitim conjunctam



junctam magis, ac aliam ob causam timebam et cum in nostra spasmi praecipue ex debilitate orirentur, non sine ratione arbitrabar, hos, si etiam per usum opii quodammodo sopiti essent, graviori impetu redituros esse. Medicamentis igitur copiosis frustra tentatis, aegram urgere et quasi ad tumulum protrudere et mihi et amicis quoque durum videbatur. Forte tamen proxima nocte si dolor nimium urgeret, aliquot grana extracti opii in aqua analeptica soluta per partes propinari posse credibile erat.

Cum itaque hoc die aegra quodlibet medicamentum recusaret, usque ad horam quintam, cum aquam ferre non posset, nihil nisi jusculum decocti avenae excorticatae cum vitello ovi in eo subacto et pauxillum cerevisiae tenuis, quo sitim magis falleret, quam extingueret, hausit, de tensionibus insuper abdominis, ex quibus summe anxia reddita est, maximopere conquerebatur. Aloe proponebatur cum sale ammoniaco miscenda et amici, omnibus rite perpensis, ita consentiebant, ut aloes succotrinae drachmae duae cum aceto tererentur et tenuissima pars soluta, aqua analeptica addita, propinaretur. Amicorum monitis tandem commota amantissima conjux hora quinta primam, septima vero

Dd 5

alteram



ram partem fumebat. Vomitus tunc movebatur, qui tamen cum tantum paucillum viscerum ex faucibus exprimeretur, non amplius subsequutus est, tandem singultus succedebat, nullus tamen ne minimus quidem ructus explodebatur. Conquereretur de sensu quodam caloris, quem tamen pulsus satis tranquillus non indicabat, ex anxietate itaque vel potius jam a resolutione humorum putrida sensus caloris derivandus erat.

Quod autem, clysmate hora quarta injecto, aliquid mucosi secesserat, versus mediam noctem aliud ex herbae salviae, summitatum meliloti et radicis valerianae decocto cum melle et oleo paratum est, quod diu satis retinebat aegra, ideoque, eo rejecto, iterum aliquid tenacis pituitae excernebatur. Ab eo tempore dolor, qui supra umbilicum premendo et terebrando urgebat, versus latus sinistrum iterum se extendebat et spem aliquam resuscitabat, obicem adhuc removeri posse, imprimis cum vesperi aliqua spasmodorum remissio observaretur. Somnus tamen nullus alliciebatur et matutino tempore spasmi et dolores in regione ventriculi, maximopere tenesi, denuo urgebant, ut tumor in ventris ultra modum excresceret.

Dies primus septembris et aegrae et mihi et amicis medicis vere tristissimus erat, quo continuis et novis doloribus atque anxietatibus defatigata, nullum amplius medicamentum deglutire audebat, cum tensio inde nimium auferetur. Nos ipsi cum tot egregia et efficacia remedia sine effectu salutari exhibuissemus, coacti substitimus et, cum de obice removendo non amplius cogitare possemus, de symptomatibus leniendis tantum solliciti eramus. Sed et hic inconsultum erat, epithemata discutientia et alia externa remedia, quae imprimis vaporosa efficacissima sunt, tumenti abdomini applicare. Sic vera corporis aegrae consideratione ducti, in clysmatibus carminativis et antispasmodicis, quibus praecipue castoreum et assa foetida adjiciebantur, per intervalla injiciendis et in externis quibusdam remediis auxilium, etsi incompletum, quaesivimus. Inunximus itaque oleo galbani partem ventris tumentem et, unguinoso bene deterfo, suffitus ex succino albo, gummi laccae, anime, olibano pannis laneis excepimus et applicavimus. Alium suffitum, ex myrrha et assa foetida paratum, ob tetrum nimis odorem aegra ferre non poterat. Sed jam ante meridiem vehementes erant anxietates, quae usque ad horam tertiam augebantur. De summa praecipue




pue ventris tensione conquerebatur optima aegra, ob quam quiescere haud poterat. Nos vero omnes experientia edocti cognovimus, has anxietates in iis non tantas fuisse, qui in ascite et tympanitide maximas ventris extensiones passi sunt. Spasmi quidem, qui funestum obstaculum movere annituntur, extensio ventriculi et intestini coli versus diaphragma nimis urgens, imbecilem et diuturno morbo maxime depressam feminam urgebant. Etsi etiam pulsus semper in moderata plenitudine et celeritate subsisteret, etsi venaesectio morbum non levare posset, tamen ex resolutione putrida humorum, quae per stasim tandem inducta est, hanc anxietatem pendere, non sine ratione conclusimus.

Verbis non exprimere possum, quantis animi perturbationibus hoc ipso die agitatus sim. Moe-
ror ex morte imminente et certa amatae conjugis, cruciatus ejus nullo modo superabiles, desperatio auxilii, quae nobis omnibus artem, quam exerce-
mus, ingratham reddidit, animum maximis curis conficiebant et deprimebant. Sed accessit alia per-
turbationis ratio, ex eo, quod omni ferme horae momento novis consiliis amicorum, medicinam ignorantium, distrahebar. Multi enim erant, qui, cum nostram amarent, de remedio obstructionis
pro-

probato cogitarent, mihiq̄ue, per urbem ambulanti, ea suaderent, vel per amicos commendarent. Si omnia ridicula, absona et saepe noxia medicamenta mihi proposita recensere vellem, usque ad succum stercoris suilli expressum et alia ex stercoraria pharmacacia deprompta deducerer. Summa profecto patientia, in his consiliis et in historiis morborum simul enarratis audiendis, per se difficilis, juvabatur tamen inde, quod amicos et amicas non ex diffidentia in nostras curandi rationes, sed vero amore in aegram impulsos, haec nobiscum communicare apparebat.

Versus vesperam incrementibus iterum anxietatibus, tensio ad spinam dorsi praecipue convertebatur, hinc inquietudo summa. Nec liquor anodynus spasmus ad breve tantum tempus solvebat. Opio quidem levamen afferri posse putavimus, sed breve tantum, cum non solum, febre inde mota, anxietatem augeri, sed hac etiam superata, similem ferme ex imbecillitate nervorum successuram esse, conjici posset. Sic nox tristissima erat, cum defatigata aegra in continuis agitationibus aliquod solatium peteret, nullum tamen obtinere posset.

Summo mane diei secundi septembris amicus medicus, qui aegrae suspiriis commovebatur, cum ejus curam hac nocte benevole suscepisset, me evigilan-



gilantem monet, ut opium darem. Cum vero perciperem, aegram nec aquae, nec infusi theae haustum deglutire posse, sed vix deglutitum iterum sine vehementi vomitu reddere et ex summo quasi pharynge eructare, dubitabam, an hoc medicamentum deglutiri posset. Sed quod cognoscebam aegram nostram opium cum aliqua levaminis spe sumere, quinque tantum grana massae pilularum de cynoglossa, aqua subacta, propinavimus. Hora tertia post usum medicamenti paullo tranquillior reddebatur et per intervalla dormiebat, sed sine sopore, aestus quoque aliquantisper, minime tamen ultra modum, augebatur. Tempus antemeridianum ideo satis tranquillum erat, cum vero versus meridiem clyisma emolliens ex meliloti summitatibus et floribus chamomillae cum oleo et melle injiceretur, nova anxietas et spasmodorum vehementia oborta est et aegra, quae tranquillitatem matutinam per opium inductam esse cognoverat et clysmatis usu turbatam se sentiebat, similem opii dosin a me exigebat. Hora tertia erat, cum omnes amici, qui semper ferme praesentes erant, ad negotia sua secesserant. Ego itaque anxius opium dare volebam, cum amatam, soporibus suppressam, ad tristem vitae exitum ducere nollem. Praeterea ego
sem-

semper de possibili adhuc obicis remotione cogitabam, quamquam per tot remedia non sublatus, sed praecclusus esset, ut opio princeps caussa removeri posset, dum spasimum solveret. Fateor, me hac hora ita agitatum esse animo, ut nulla mihi tristior fuerit. Amata tamen conjux insistebat et me per amoris conjugalis summam vim obtestabatur, ne ei unicum hoc vitae solatium detraherem. Accedebant interea nonnulli amici medici, qui me timidum solatio erigebant, quorumque suasu tandem quinque grana massae pilularum de cynoglossa ei propinabam. Sed hoc quoque sumpto remedio, summa et vere semper aucta anxietas cum tensionibus et spasimis aegram urgebat. Suffocationem semper et rupturam ventris saepe timebat continuis suspiriis agitata aegra, ut omnes adstantes amici et medici ipsi tristitia summa affligerentur, omnesque hac nocte finem malorum avide expectarent.

Et aliquoties jam in progressu morbi et hoc praecipue die medici nonnulli de aqua, per intestinum rectum injicienda et per inferiora ad locum obicis urgenda, cogitaverant, cum ex omnibus morbi phaenomenis appareret, angustiam quandam leniter extendendam et superandam esse. Hoc etiam in nostra aegra fieri posse videbatur, cum tensio ab-

domi-



dominis in inferiori parte non tanta esset, quanta in superiori; ex qua re evidenter apparebat impedimentum non in aliqua parte tenuium intestinorum esse, sed in colo, quod per flexus hujus intestini sinistros usque ad locum sub liene sine metu anxietatis majoris efficiendae extendi poterat. Vere tamen timendum erat, obicem, in parte superiori, tanta hucusque medicamentorum copia hausta non remotum, ab inferiori parte tentari haud posse, cum contracta inter duplicem extensionem intestini pars, facile ad rupturam disponi posset. Quod jam autem metuebamus, id nunc potissimum, cum intestini coli pars vel inflammata, vel ob putridam humorum resolutionem jam in gangraenam abiisset, aegram nostram, auctis doloribus, praecipitasset. Quam ob rem cum de nulla, quam externa medicina, cogitari posset, unguentum de arthanita propositum fuit, quod in hos usus recens confici jussi, quod tamen cum tantum leniter et sine omni frictione illiniendum esset, parum profuit, ita ut tandem ne extremum quidem hoc remedium ulterius tentari posset.

Sic ultima nox tristis accedebat, in qua finem malorum a Deo ardentissimis precibus efflagitabat nostra. Pulsus celeritas hucusque vix percepta vehementer



póris situ disquisiui, ne incarceration funesta clanculum obreperet; nunquam autem nova incommoda inde oborta sunt. Ante decem annos in ultimo et omnino felici puerperio, in hujus praecipue morbi initio et progressu, de hac re inquirenda sollicitus eram, sed non nisi hoc ipso die, nova protrusio intestini in saccum herniae denuo oborta erat, quod, si ego quoque negligentior in observando fuisset, charissima tamen aegra, quae locum optime noscebat, se de hac re sollicitam fuisse affirmabat. Quanquam vero haec tumoris protrusio animum meum maxime commovebat, nihil tamen in aegra ex aliis causis morti proxima suscipi poterat, cum repositio herniae, ob nimias infirmi ventris tensiones, prorsus impossibilis esset.

Transiit igitur molestissima haec nox inter atrocissimos dolores et anxietates charissimae aegrae, illa vero cum parum in lectulo quiescere, simul ob summam imbecillitatem, nec in sedili detineri, nec pedibus insistere posset, tamen quod a situ corporis erecto aliquod levamen doloris persentisceret, aut in lectulum pulvinaribus altiore redditu ventre incumbere, aut ab amicis, qui ejus curam habebant, ipsoque medico, qui nostram omnibus modis sub-

levare

levare annitebatur, humeris levata, in erecto situ retenta vel per conclave tracta est.

Illuxit tandem dies tertius septembris nobis funestissimus, quo amata conjux, quae jam dudum finem malorum mortemque beatam expectaverat, summo mane mecum ardentissimas preces fundebat, ut Deus, qui eam tot beneficiis ornasset, et saepe in summis periculis servasset, nunc vitae finem non inter atrocissimos dolores imponeret et quasi de ejus auxilio desperantem raperet, sed ut tranquillum et blandum, doloribus remittentibus, exitum ex hac vita et ingressum ad beatam et aeternam sedem ei concederet. Tamen perdurabant adhuc anxietates, quae illam per plures dies conquassaverant et cum verbi divini minister summo mane accersitus ejus animam, solatiis ex sacra scriptura hausit, confirmare et constantiam ejus in fide etiam inter tot taedia sustinere anniteretur, ea quidem patientiam et tranquillitatem animi servabat et, se huius solatii participem factam esse, affirmabat; corpore tamen quiescere non poterat, sed misera, vermis ad instar, corpus torquere et in mutato situ solatium quaerere cogebatur.

Hora octava frigidi accedere videbantur sudores, quos tamen mox transitorius aestus excipiebat,



ut denuo anxia redderetur. Cum autem hora nona ad eam accederem, me osculo suavissimo excepit et laeta pronunciavit, nunc finem malorum, hucusque toleratorum, adesse, petiitque a me, ut Deo supplex gratias agerem, quod eam non in mediis anxietatibus e vita tolleret, sed ante obitum aliquam requiem concederet. Imprimebat manui meae apices digitorum jam frigidos, doloremque nunc cessare affirmabat, de levioribus et cum prioribus nullo modo comparandis anxietatibus tantum conquerebatur, quas patienter et cum summa in Deum fiducia ferre posset, inprimis cum anxia et suspiriosa respiratio non amplius urgeret, nec ullus suffocationis sensus perciperetur. Quemadmodum autem jam die superiore parum deglutire poterat, sic hoc die nihil prorsus potus aquosi calidi, vel frigidi hauriebat, quod protinus sine multa nausea et nifu eructabat; sola cerevisia tenuis ad linguam humectandam hausta sensim per oesophagum descendere videbatur, quod aliquis in potu fermentato stimulus erat.

Post tot itaque dies dolorum plenissimos ultimus et moribundae gratissimus et nobis summo solatio erat, quod constantiam ejus in ultimo vitae articulo admirabamur et amatam sine dolore esse cognoscebamus.



bamus. Interdum igitur pias meditationes de morte, adhortationibus amicorum adjuta continuabat, interdum cum omnibus amicis placide colloquebatur et iis ultimum vale dicebat. Moeror, qui, dum haec scribo, animum meum opprimit, haud permittit, ut ea proferam, quae tranquillitatem, in beata morte positam, luculentis testimoniis declarant. Sufficiat dixisse, omnes amicos, qui verae et christianae constantiae vim in hoc exemplo cognorant, similem exoptasse mortem. Ego vero vehementissimo animi affectu commotus, lacrymas non satis reprimere poteram, illa, mei amantissima, blande subridens, lacrymas meas frigida manu detergebat, eoque momento, quo, filiis ejus manus exosculantibus, monita cum votis maternis tradidit, nullam effudit lacrymam, sed hos filios et futuram eorum sortem praecipue Dei providentiae concedebat, mihi que sedulam eorum educationem commendabat.

Pulsus tunc eeler quidem et debilis erat, sed aequalis, quod exiguam, quae adhuc supererat, circulationis vim sine impedimento universali a corde et vasis majoribus absolvi, indicabat. Et post meridiem et cum labia jam frigida essent, quibus interdum blanda oscula impressi, sensus externi quodam-



modo debilitari videbantur, interni tamen semper vegeti erant, ita ut nulla deliria perciperentur, nisi suavia quaedam, quae, quiescente ea et non nihil dormiente, intercurrerant. Ego vero optabam, ut dormiret et evigilans ultimum vitae momentum, subito erepta, sentiret; timebam tamen novos insultus spasticos et recrudescentes anxietates. Frigus tandem sensim occupavit omnia membra et praeter tensiones abdominis, ob quas saepe situm erectum corporis urgebat, sudor frigidus ipsae molestus erat. Optabat saepius, ut, linteis mutatis, ab hoc incommodo liberaretur, sed adstantes amici dissuadebant, eique dolores graves in animum revocabant, quos ante percepisset et hac mutatione iterum excitatura esset. Illa itaque post horam septimam aliquam in somnum propensionem sensit, ipsa enim dicebat, se dormire velle, sed id ab amicis petiit, ut summo mane eam expergefacerent et tunc linteâ humida mutarent, ipsoque hoc momento, in latus dextrum conversa, obiit.

Sic mihi erepta est charissima conjux, quae per viginti et unum annum et imbecillis et aegrotâ aerumnosam meam et laboriosam vitam consortio, consilio et auxilio felicem reddiderat; sic tandem postquam per tot aerumnas miserae vitae agitata, semper

per tamen providentiam divinam pio pectore coluerat, mors beata et tranquilla summam felicitatem animae charae concessit.

Reliquit vero beata anima nobis corpus sic deturpatum, ut ejus disquisitionem multis rationibus permotus susceperem. Ipsa etiam aegra hoc petierat, ab amicis, cum non abhorreret a sectionibus cadaverum. Ratio saepe et nunc praecipue impeditae excretionis alvinae in sinistro potissimum latere posita, causae inertiae bilis, constitutio herniae cruralis, curatae quidem, sed in ultimis vitae diebus rursus obortae, sine attentata disquisitione dimitti non poterant. Cum autem amata conjux sectionem post mortem, non a me, sed a quibusdam amicis petiisset, ego illis hoc amicitiae officium concessi, et id tantum mihi dari volui, ut, aperto cadavere, primarios laesionis modos ipse inspicerem. Quemadmodum autem vita conjugis aerumnosa ac laboriosa et morbus ultimus in suo progressu difficillimus erat, sic etiam libere profiteor, inter omnes sectiones cadaverum, quarum intra triginta annos plurimas suscepi, nullam fuisse, quae me simili modo commoverit. Non solum enim durum mihi erat, viscera amatae conjugis inspicere, sed ingrato hoc animi affectu superato, perversus etiam



partis laesae fitus nos in errorem ducebat, ex quo post accuratam et ultra horam durantem disquisitionem nos extricavimus, morbique singularem rationem deteximus.

Denudato corpore, ambitus abdominis feminae macilentae et tenerae erat ulnae unius cum semisse et quinque pollicum, filo circumcirca ad regionem umbilicalem ducto. Longitudo fili a cartilagine xyphoide sterni usque ad os pubis ducti, tres quartas ulnae et digitos quatuor referebat. Ita vero tensa erant integumenta communia et propria abdominis, ut difficulter inciderentur, ac specillum et digitum, incisionem dirigentia, vix admitterent. Omnibus his incisis et revolutis, intestina tenuia flatibus moderate distenta invenimus et coecum, quod quodammodo eminebat, amplum quidem, minime autem ultra modum inflatum erat, colon, ubi a coeco sursum procedit, parum distentum erat, sensim vero ad mediam partem transversim, quam zonam vocamus, productum ita expansum erat, ut medius ambitus ulnae semis et quatuor digitorum esset, transversa zona a dextro latere usque ad lienem, ubi se abscondebat, ulnam unam cum quadrante et tres digitos aequabat. Omentum non deprehendimus, quod enim macilenta erat nostra,



stra, in tenerum et contractum contextum cellulofum, in tanta distensione ferme prorsus evanescentem, transiisse videbatur.

Supra colon et in utroque hypochondrio et scrobiculo cordis, vulgo vocato, ventriculus (hunc enim ob oculos habere credebamus, antequam fallaciam detegeremus) maxime distentus, inflammatus et jam quodammodo gangraenosus eminebat, cujus curvatura magna ulnam unam et digitum unum, ambitus medius tres quartas ulnae et duos digitos referebat. Adeo vero prominebant ventriculus et colon, ut ad ulteriorem partium disquisitionem procedere haud possemus, nisi, puncturis acu inflictis, magnam vim aeris foetidi emissemus. In cavitate, quam ventriculum esse credebamus, multa materia spissa, in zona coli praeter aerem nullae ferme foeces reperiebantur.

Colon postea in sinistro latere sub liene disquisivimus, illudque ad peritonaeum et diaphragma posterius adhaerere cognovimus. Haec pars angusta quidem, in ipsis tamen tunicis parum callosa erat: sed a latere ejus et ubi accreverat, striae tenaces quasi ligamentosae, cum pinguedine indurata coalitae, inveniebantur. Nexum hunc dum solvere et continuationem coli sub liene detegere tentare-

E e 5

mus,



mus, pars adhaerens coli dilacerata est et in parte abrupta, quae deorsum ad flexus coli sinistros ducit, angustum orificium, pennam auferinam vix admittens, deteximus, hoc tamen per rupturam contractum et angustius factum esse credebamus, cum continuatio coli non nihil amplior esset. Lien parvus, sed nulla labe corruptus erat et post eum superiorem partem coli abrupti frustra quaerebamus, cum illa nobis se prorsus subduxisset. Accessimus itaque ad disquisitionem cavi, quod ventriculum esse credebamus et cum sub fornice diaphragmatis in eo loco, ubi cardia, ex oesophago descendens, in ventriculum extenditur, initium disquisitionis facere vellemus, digitus in cavum hoc, gangraena jam ex parte corruptum, penetrabat et scybala tenacia tactu percipiebat; insignem enim horum copiam expressimus et eduximus, quo, cavo collapsio, reliqua accuratius investigaremus.

Quoniam autem in hoc cavo facile dilacerando, perversi situs rationem invenire haud potuimus, ad zonam coli regressi sumus, nunc, flatu emisso, paullo flaccidiorem, et caute a latere dextro ad sinistram progrediendo ad locum obicis iterum accessimus, sed perturbati vidimus, colon non tantum cum ventriculo cohaerere, sed vere in eum continuari.

Cogno-

Cognoscebamus igitur, cum rem impossibilem inveniremus, nos deceptos esse, causam vero erroris nondum detegere potuimus, cum situs hujus cavi membranacei, quod a multis retro annis regionem scrobiculi cordis tensam et dolorosam effecerat, non nisi de ventriculo nos cogitare permitteret. Etsi enim amici partem forte duodeni, supra modum extensam, hic eminere posse credebant, cum a parte hepatis liberum fluctuaret et ut cardiam non ostenderat, sic etiam pylori vestigia non referebat, ventriculi tamen absentiam nullo modo explicare poteramus.

In disquisitione viscerum, situ perverso conspicuorum, nullum e loco movendum esse, antequam vera ejus ratio detegatur, lex est, quam et nunc nobis injunximus. Optimum certe fuisset, et suadebant amici, sternum solvere et, relaxato non nihil diaphragmate, hanc partem maximopere extensam sub fornicem ejus protrusam et plenius perspicere et non nihil reclinare; ego vero animo et roerore et erroris consideratione agitatus, amatae corpus ulterius dilacerare nolebam. Aliud igitur capiendum erat consilium. Incidimus nimirum mesocolon, quo coli tractum eo melius dijudicare possemus et plane perspeximus, hunc saccum, qui ventriculus esse videba-




debatur, veram et connexam coli partem supra modum extensam esse.

Evacuato igitur ulterius hoc sacco, qui morbi, mortis et erroris causa erat, eoque nunc paullulum reclinato, vidimus sub eo ventriculum verum, solita forma, sed paullo minorem, nullo aere nulloque alimento repletum, nullamque callositatem, nec inflammationem in eo conspeximus, quanquam ille versus hepar dextrorsum atque retrorsum valide depressus fuisset, ita ut nec ructum, nec vomitum edere et ultimis diebus nihil ferme per cardiam in eum descendere potuisset. A cardia per curvaturas ventriculi ad pylorum ducti, duodenum quoque in vero situ deprehendimus et in transitu ad pylorum et jejunum viam ejus liberam, etsi quodammodo depressam invenimus: Et jejunum totum sanum nos duxit ad convolutiones ilei sinistri, cujus partem in herniam cruralem detrusam et sphacelo affectam conspeximus. Hoc ileum post partem herniae interceptam vacuum magis erat, minime vero callosum, hinc dextrae etiam convolutiones liberae erant et transitus hujus intestini inter coecum et colon ad crassa, naturali modo constituta erat. Progressi sumus ad colon, super renem dextrum ascendens, postea ad ductum zonae coli transversae

versae progrediendo, pervenimus in illud cavum, quod ventriculum esse ex situ et extensione credideramus et jam vere cognovimus, hunc saccum esse partem coli, sub liene progredientem et ad angustum locum sub liene ad diaphragma accretum, in quo nimirum loco obicem in sinistro latere, durante morbo, semper ferme sensit aegra et nos etiam sub initium morbi quaesivimus.

Sic ex errore in viam reducti, cognovimus, a longis retro annis hanc partem coli quodammodo extensam et continuationem hujus intestini super renem sinistrum simul quodammodo sursum ductum esse. Saepius enim narrabat mihi optima conjux, se olim magna pondera coxae sinistrae imposita portasse et quanquam inde, nec spinae rectitudo laesa, nec ossa coxarum inaequalia facta erant, abdominis tamen tensiones ipsi crebrius molestas fuisse. Nos etiam colon a liene super renem usque ad initia re-
 cti mensuravimus et S romanum sive flexus coli sinistros inferius magis rectos et totam longitudinem, vix ulnam superantem,prehendimus. Perspeximus quoque, firmiorem adhaesionem ad partem diaphragmatis sub liene inveteratum malum esse, quod membranae vicinae laxae alias, pingues, contractae et callosae erant, quanquam ipsa angustia in-

testini



testini non longa et in tunicis parum tantum callosa erat. Jam dudum igitur, praecipue tamen in ultimis vitae annis, his tensionibus et inde obortis anxietatibus agitata est, leni laxante et praecipue clysmatibus parum levata. Cum enim semper ferme de ventriculo tumente conquereretur, ipse tamen ventriculus in disquisitione sanus et nulla labe affectus deprehensus esset, cum alvus simul tarda et sicca esset, intestina autem, nec angusta, nec callosa invenirentur, extensam hanc coli partem a longo jam tempore perverso hoc situ fuisse, non sine ratione concludimus.

Die tandem vicesimo primo augusti, qui est initium morbi, foeces ob inertiam bilis tenaciores et quasi argillaceae, in hoc sacco collectae, per viam in loco coalitionis angustatam non amplius transire poterant, ex qua re vehemens ille doloris sensus in latere sinistro ortus est, nec exercitatio corporis in aere libero, nec clysmata crebrius applicata viam perangustam laxabant et foeces tenaces promovebant, saccus igitur hic coli sensim in stupendam illam molem extensus est et cuncta, quae ab eo tempore ingesta sunt alimenta, potulenta et medicamenta recepit.

In accuratiori contentorum examine copiosas foeces proxime ad angustiam deprehendimus, in quibus adeo emolliendis et urgendis, medicamenta ingesta parum praestare potuerunt, ita enim tenaces erant, ut per duodecim dies in aqua, saepe nova affusa, maceratae, non emollitae et solutae sint. In media sacci parte massa magis soluta deprehendebatur, bruno colore tincta, tandem vero nigra magis subsequabatur, a mercurio vivo in hac massa agitato et quasi subacto. Disquirendum nimirum erat, num mercurii, cujus septem uncias degluti-
verat nostra, partem iterum collectam invenire possemus, sed, omni cura adhibita, ne drachmam quidem mercurii currentis colligere potuimus.

Obicem igitur, quem nostris auxiliis superare non potuimus, in angusta via et in insigni cavi nimium distenti atonia positum fuisse, aperte cognovimus et simul certe intelleximus, nullum aliud inveniri potuisse, per quod amata mea servaretur. Etsi enim via non penitus praeclusa erat et per angustatum etiam canalem foeces transprimi potuissent, cognovimus tamen, ipsum saccum mole sua hoc orificium compressisse et qui in progressu juvando necessarii erant motus, spasmo continuo excitato, densitatem obicis auxerunt,

Ad



Ad herniam quod attinet, intestini ilei pars demum pridie ante obitum incarcerata, paullo post inflammata et sub vehementissimis cruciatibus sphacelo affecta est. Mirandum tamen est, aegram ob dolores in parte superiori abdominis, hos in parte inferiori vix sensitisse; saepius enim a me interrogata respondit, eam hoc in loco et quodammodo presso nullum dolorem percipere. Hanc vero herniam jam ante plures annos obortam et sanatam ultimis demum diebus iterum processisse, ex eo concludi poterat, quod ante locum intestini intercepti hoc nullo modo et vix aere distentum erat, omniaque, quae, durante morbo, ingesta fuerant, per hanc intestini partem ante incarcerationem transierant et in sacco supra descripto demum collecta inveniebantur. Examinavimus vero portionem intestini interceptam, quae duorum pollicum erat inflexa et ita tota incarcerata, pars intestini nigra corrupta, attamen non dilacerata, in cavo autem sacci herniosi sanguis resolutus putridus haerebat. Nos vero, discisso ligamento, sub quo intestinum processerat, hoc demum eduximus et inde cognovimus, quam difficilis fuisset operatio, si hernia citius oborta, eandem necessariam reddidisset.

Quem-

Quemadmodum vero lienem parvum, attamen ab omni labe alienum, diximus, sic hepâr simili modo omnes notas sani visceris referebat, nec mole increverat, vesicula fellea etiam, quae in sinu consueto adhaerebat, paullo quidem major, sed ultra modum non distenta erat, etsi magnam calculorum copiam continebat. Bilis simul cum calculis in vesicula contenta nigra, spissa, amara, paullo tamen fluidior, quam mel erat, difficile tamen ex cystide et ex hepatico ductu ad duodenum transisse, ex parvulis calculis, usque ad cholodochum protrusis, patebat. Calculi erant leves et flavi, ut biliarii esse solent, nonnulli magis pallidi, omnes quibusdam maculis nigris adpersi. Etsi vero non omnes colligere potuerimus, ducentos tamen et sexaginta numeravimus, quorum omnium pondus die decimo septembris, jam ficca superficie, erat drachinarum quinque, granorum decem, quod vero sensim decreverat, ut, iis sexto die decembris iterum ponderatis, uncia semis et grana quadraginta octo superessent; nimirum

2. maximi nucis avellanae magnitudine, major minus angulosus, quam minor, ille pondere granorum viginti sex, hic scrupuli unius erat.



10. majores nucis avellanae minoris vel ciceris feminis magnitudine varie angulosi, quorum pondus erat drachmae unius et granorum viginti trium.
14. minores pisi majoris magnitudine, pondere granorum quinquaginta unius.
35. minores pisi minoris magnitudine, pondere drachmae unius.
193. minimi sabuli majoris et minoris magnitudine pondere granorum quadraginta octo *).

Quanquam autem haec calculorum moles, sensim increscens, futura mala inducere potuerat et jam causa fuerat inertiae bilis, in qua tenaci et viscida, ad digestionem juvandam et foeces stimulo promovendas minus idonea, calculi facile generantur, in ipso tamen morbi progressu spasmodorum causam non fuisse persuasus sum, cum in dextro latere dolor tensivus nunquam perceptus sit. Id autem certo statui posse arbitror, pressionem, ab extensione insignis partis intestini coli jam dudum abortam, lienis et hepatis viscera, in bile bona conficienda diu
 impe-

*) Die decimo nono februarii hujus anni septuagesimi pondus omnium calculorum, repetito et accurato examine, vix ad granum unum et alterum imminutum inveniebatur.

impedivisse et inertiam hujus humoris digerentis, non ut causam, sed ut symptoma morbi principis considerandam esse. Mutua profecto sunt viscerum abdominalium officia et uti flatibus distenta intestina ob defectum stimuli bilis saepe motum peristalticum languidum exercent, sic distensiones intestinorum tympaniticae bilis quoque elaborationem quam maxime retardant et digestionis officinas in elaboratione boni chyli impediunt.

Has aliasque animadversiones in recensione morbi et sectionis piae conjugis sparsim inferere potuissem, cum, amicorum consiliis et sermonibus inter nos collatis, de multis actum sit; sed cum jam nimis prolixa sit haec commentatio, vobis pluribus digressionibus taedium creare nolui. Nonnullas tamen, quas jam delineavi, tractationes v. c. de causis obstructionis alvinae et remediis ei accommodandis; de differentiis anxietatis in morbis, ad nervosam imbecillitatem reducendis, cum in vera mendi ratione ad has res respiciendum sit, data opportunitate, vel in libellis academicis vel in his adversariis tradam.



III.

Oratio de diffensu medicorum in commodum artis salutaris convertendo. Mense maio 1759. in solemni doctoris inauguratione recitata.

In insigni hominum differentia, quae nobis, inter illos cum cura et attentione versantibus, contemplanda atque dijudicanda se offert, non tantum ad vultum, corporis habitum et vires, reliquasque externas dotes, sed multo, etiam magis ad diversas animi propensiones respiciendum esse, quilibet aequus rerum aestimator intelligit. Si enim de vera vitae nostrae felicitate serio cogitamus et nos non nobis tantum, sed aliis quoque vivere cognoscimus, omnino etiam aliorum societate et auxilio nobis opus esse apparet. Quamquam autem variae sunt hominum propensiones in vitae genere, amicis, victu et aliis rebus, ad comoda et necessitates vitae hujus pertinentibus, acquirendis; quamquam diversae eliguntur viae, quibus ad felicitatem publicam et privatam perveniri quidem arbitramur, in omnibus tamen iis recte et semper definiendis persuasum nobis habemus, regiam et unicam veritatis et virtutis viam esse ingrediendam.

Qui

Qui vanitate gloriae, voluptatum illecebris, divitiarumque splendore delectantur, opinatam felicitatem captant, veram negligunt, nec unquam serio perpendunt, nos non nobis solis, sed et aliis vivere; in colendo Deo summam et in studio, amicis et civibus inserviendi, non minorem felicitatis sensum positum esse et ita demum, si vitam nostram Deo probatam et aliis utilem reddamus, ad veram animi tranquillitatem, maximum vitae solatium nos adspirare posse. Dissensum in vera felicitate definienda doctrina moralis, philosophica et christiana genuinis scientiae primae fundamentis innixa componere valet. Haec indubitata vitae commoda ob oculos ponit et virtutis verae studiosos eo impellit, ut unanimi consensu in publica felicitate conservanda animi corporisque vires intendant, cum ex ea etiam privata salus oriatur.

Et si vero viri docti, qui veram sapientiam colunt, in rebus humanis accurate aestimandis et ad ultimum finem referendis, attentius versantur, imbecillitas tamen, nunquam a rebus humanis aliena, in adjumentis eligendis et fine definiendo, iudicii ambigui et oborti inter eruditos dissensus causa est, qui non solum in graviorum rerum disquisitione, sed etiam in negligentiori vulgi consideratione cer-



nitur. Haec iudicii inconstantia interdum in eruditorum opprobrium sic vertitur, ut iis objiciatur, eos de rebus omnibus dubitare, inter se dissentire, ideoque nunquam ad veram rerum cognitionem pervenire.

Et profecto nulla est scientiae humanae pars, quae experiundo discitur et cogitando excolitur, quin ex variis opinionibus hominum doctorum dissentium habeat. Audiatis interpretes legum divinarum et verae religionis statores, quantum in explicatione rerum dissentiant. Nonne a multis retro seculis haereticorum multitudo ecclesiam veram ita perturbavit, ut cordatiores theologi in evertendis et refellendis opinionibus profanorum hominum plus temporis, quam in explicandis et dilucidandis verae religionis dogmatibus impendere teneantur. Leges civiles, a magistratibus sancitae, per se faciles et ad ordinem et tranquillitatem rerumpublicarum conservandam praescriptae, tantis tamen interpretationum dissensionibus agitantur, ut continuae ferme controversiae de eorum usu, in variis vitae partibus, obortae fuerint. Quae cuncta et inde oriunda felicitatis publicae impedimenta nunc fusius declarare mearum partium non esse censeo, cum erudita illarum rerum cognitione non imbutus, certo eas dijudicare nequeam.

Ad medicos potius me converto, quorum non dissensus modo, sed et causas dissentiendi toties cognovi. His quidem nulla lex scripta est, sed naturae universae et ejus operum et virium contemplatio normam ipsis praescribit, ad quam omnia ita judicanda sunt, ut, collectis observationibus, non sine magna utilitate et conservare sanitatem et restituere possint. Verum, etsi naturam et vias ejus non semper assequi observando et cogitando possunt, cum interdum lux nimis splendida oculos hebetet, interdum nimia rerum obscuritas disquirentibus caliginem offundat, tamen jam in observatione illorum phaenomenorum se offert differentia, ut, quod sensu percipi videatur, non semper certum sit, ex qua re per se insignis et longe major in usu ipso, oboritur dissensus. Quanta diversitas in rerum causis perscrutandis et definiendis? quanta varietas in effectibus eorum ordinandis et dijudicandis? quanta discrepantia in conclusionibus eliciendis? quanta ergo difficultas in scientiae medicae principiis et fundamentis stabiliendis confirmandis et exponendis?

Non tantum vero in medicina addiscenda et excellenda opinionum divortiis distrahimur; sed cum ad agendum ventum est, tum demum dissensus medentes maximopere anxios habet. Hi enim ad lectulos aegro-



rum vel dubitando agitantur, vel cum aliis medicis consultando controversiis irretiuntur et ita haud raro et aegros et aegrorum amicos, qui dissensum ipsum non ejusrationes perpendunt, in metum conjiciunt, ut de medicamentorum, post hunc dissensum electorum, effectu desperare incipiant et saluti aegrorum parum consultum esse arbitrentur. Verbis vix satis exprimi potest, quanta inde in culturam et exercitium artis redundant damna. Controversiae enim a medicis eruditae motae, non nisi a sapientioribus dijudicantur et componuntur, quod si vero ex ignorantia rerum et negligentia accuratae observationis excitentur et in altercationes et publicas atque privatas inimicitias transeant, arti salutari tandem opprobrio sunt.

Equidem horum dissensuum exemplis enumerandis, molestus Vobis esse nolo, quanquam enim nonnullis risum, veris tamen medicis et mihi ipse bilem moverem, nec oratio ullum fructum promitteret, id potius agam, ut, fontibus veri dissensus medicorum detectis, ostendam, quomodo ille, si recte tractetur, in verae medendi artis commoda converti queat. Difficilis et ampla omnino est res, cum non tantum controversias ratione cognitionis et applicationis regularum artis motas, componere, sed adjuncta etiam, quae ad hunc finem ducunt,
 optima

optima declarare debeam. In tanta vero rerum copia, quae mihi se offert consideranda, selectu utar et primaria doctrinae capita tangam, quibus in universum propositis, cetera et singularia facile cognoscuntur. Confidenter itaque spero, Auditores humanissimos hos meos conatus favore audiendi adiuturos et aequo animo excepturos esse, cum intelligant, quanta sit praestantia medici, qui controversiis, in variis doctrinae partibus motis, ita uti didicit, ut medicam scientiam non obscurant, sed variis adeo modis illustrent. Doctrinae etiam nostrae alumnis denuo persuadebitur id, quod haud raro in exponendis doctrinis medicis exemplis illustravi, in vehementissimis controversiis, cum medici contrarias saepe partes tenent, mediam viam, a contentioso dissensu alienissimam, eligendam esse.

Mihi autem, dissensum medicorum ad optimum finem, hoc est, ad veri inventionem ducturo, in causas ejus quodammodo inquirendum esse praevideo. Contemplatio corporis humani sani et aegroti ejusque nexus cum externis rebus, quae nos ambiunt et varia ratione corpus humanum afficiunt et mutant, animum medici ita instruit, ut normam inveniatur, ad quam sanitatis conservationem consiliis, restitutionem remediis juvat. Sed accurata haec,



naturae indagatio ardua est, nec a quolibet imperito suscipi potest, sed exercitatum animi corporisque viribus egregie instructum postulat investigatorem. Copia enim et differentia rerum contemplandarum et varietas causarum, quas natura in corporum mutationibus efficiendis sequitur, tantam exigunt curam, ut nec sagacissimus scrutator omnes naturae vias ubique rimari queat, quamobrem pauci tantum ad aliquam, et in arte faciendam utique necessariam, effectuum naturae cognitionem perveniunt. Quicumque igitur naturam fugitivo oculo sequuntur, illi omnem ejus modum non certo cognoscunt, sed obscuris ideis impediuntur, phaenomenorum copia et inconstantia saepe turbantur, ideoque conclusiones, quas ex his elicere tentant, ut plurimum dubias reddunt. In primo itaque aspectu nunquam acquiescendum est, sed singula phaenomena, quoniam fundamenta demonstrationum exhibent, studiosa et repetita perlustratione aestimanda et ordinanda sunt. Cum enim nos in observando saepius deceptos videamus et res cognitatas in usum haud convertere queamus, vere discimus, non nisi recte collectis et repetitis observationibus inhaerendum esse, si ad certam scientiae medicae cognitionem adspiremus.

Sed

Sed etiamſi multa doctrinae noſtrae capita ſtudioſe coluerimus, et varia ex illis experiundo confirmaverimus, aucta tamen rerum copia et ubertate naturae, ac varietate in phaenomenis percepta, non ſemper bene utimur cognitione, non ita comparamus invicem res et digerimus, ut ab iſta multitudine plane nihil incommodi metuendum videatur. Coniungimus ſaepe ideas, quae coniungendae non erant, alias ad nexum plane neceſſarias negligenter omittimus et ita ſaepe prae imbecillitate virium omitimus vel obiter attendimus eas res, quae ad conſiſiones eruendas praecipue faciunt, cum interea perſuaſi ſimus, nos omnem propoſitionum nexum accurate diſquiſiſſe, decepti ad errores deducimur, quos occoecati quaſi defendimus et ſaepe ex alio errore in alium devolvimur.

Interdum ab opinionibus his falſis nos revocat Virorum clariffimorum diſſenſus, qui, etiamſi nobis ingratus ſit, nec animos noſtros penitus inclinet, ex ea tamen parte nobis utilis eſt, quod nos ad obſervationes et tentamina caute repetenda impellit. Omni itaque rerum nexu denuo perpenſo, vel conſiſti aliorum, etſi nobis contrariam, ſententiam probamus, vel limitandis iis, quae olim ubique valere viſa erant, noſmetipſos corrigimus. Cum
ita-



itaque nonnullis exemplis moniti perspiciamus, nos in errore perseverasse, nisi dissensus aliorum nos in viam reduxisset, hanc correctionis rationem saepius sequimur et, ut alii de nostris opinionibus dubitant, sic nos quoque de rebus accurate perpensis subdubitamur, quo melius in iisdem confirmetur animus et ad constantiam sapienti viro dignam deveniat.

Si in scientia naturali et medicina colenda omnes naturae indagatores phaenomena pari oculorum et mentis acie contemplari possent, si omnes in ordinandis propositionibus praemissis et conclusionibus inde eruendis, aequali animi contentione uterentur, nullus omnino inter eos dissensus oriretur; sensus eorum naturae phaenomenis simili ratione afficerentur et mens ubique vera rerum cognitione instrueretur. Cum autem vires cognoscendi veri adeo diversae sint et phantasia, nimis excitata, discordes saepe et fallaces imagines admisceat, in cultura studiorum dissensus evitari nequit.

Neque tamen incondita dissentientium turbamur nos in accurato rerum scrutinio perturbari patiamur, sed non nisi dubitationes a viris doctis et in observando et dijudicando exercitatis motae, nos impellant, ut diligentius in res proponendas inquiramus. Quanta quaeso est differentia hominum doctorum,
qui



qui ad rerum naturam quaerendam et declarandam animum applicant, ratione intellectus et voluntatis? Quot sunt, qui apertis oculis non videant et phaenomena luculenta, crebrius oblata, haud percipiant ac tamen de rebus parum cognitis coeci judicent. Ejusmodi homines locum inter eruditos immerito sibi vindicant, cum non nisi loquacitate excellent. Sunt tamen multi, qui, si ex institutione praceptorum vel ex libris, obiter perlustratis, rem quandam animo impresserint, eandem sine ulteriori examine et acriter quidem, defendant, centies iterum effutiant, omnibus molesti, qui non simili ratione cogitant et docent. Hi ergo, quoniam vim veri non sentiunt, nec studia nostra dissensu suo turbare possunt, ad aniculas blaterantes amandandi sunt.

Aliud naturae indagatorum genus verae scientiae naturali insigne damnum affert, cum specie accuratissimae disquisitionis non nisi figmenta proferat. Hi effectus rerum naturalium nunquam ab assidua, sed negligentiore tantum phaenomenorum naturae contemplatione repetierunt, sensus in rebus perspiciendis nunquam exercuerunt, sed excitatam ingenii vim, in evolvendis rerum causis omnia definire posse contendunt. De rore disputant, utrum matutino tempore ex terra ascendat, an potius ex
atmo-



atmosphæra descendat et in lite dirimenda ad mediam usque noctem librorum lectioni inhaerent, res ibi declaratas continua cogitatione prosequuntur, auroram ipsam nunquam vident, nec utramque foliorum superficiem irroratam esse animadvertunt. De usu partium corporis humani disserunt, sed dissectores reformidant et spurcitiem anatomicam, quam dicunt, horrent. De mixtionibus corporum loquuntur, carbonum tamen pulvere digitos inquinare nolunt, ne libros forte, ex quibus cognitionem anatomicam et chemicam repetunt, impuris manibus maculent. Hi omnes, quod, vera naturæ contemplatione neglecta, sola librorum lectione erudiri cupiunt, dissentientes semper auctores evolvunt, ideoque sua culpa ad continuum dissensum compelluntur, in ea re inveniendi veri normam quaerunt et audacter affirmant, verum in rebus non nisi disputando erui posse et debere. Cum vero rerum physicarum et medicarum investigatores intelligant, rationem demum experientiae successisse, facile cognoscunt, ejusmodi disceptationibus frivolis scientiam rerum naturæ magis impediri, quam provehi, nec veram scientiam, quam ipsi naturæ, per opera sua nos erudienti, debemus, inde expectari posse. Qui itaque omne studium in meris hypothe-

pothe-

pothesibus inveniendis et audacter defendendis impendant, sibi et corruptae phantasiae relinquendi, nec corrigendi sunt, viam enim omnis correctionis fugiunt, certum non quaerunt, falsum non cognoscunt, sed dissentendi fervore sibi solis placent.

Quoniam autem ad naturae sacra arduus accessus est et iis quoque indagatoribus, qui serio in corporum indolem et mutationes inquirunt, vel destitutis multitudine subsidiorum, ad observandum necessariorum, vel privatis opportunitate observata repetendi, multae dubitationes relinquuntur, quae tandem dissensum pariunt, quod ex observationibus mancis et incertis certae conclusiones erui nequeant, hi in veri indagazione adjuvari debent et possunt. Si nempe ingenui, honesti et diligentes naturae indagatores, in disquisitionibus rerum naturae ad falsas sententias deflectunt, suspicione quadam erroris mota, se extricare annituntur, ideoque dissensum exercitatissimorum virorum attendunt, quo per eum melius instruantur. Hi, quod non sibi sapiunt, sed correctionis cupidi sunt, facile vincuntur et in veram viam revertuntur, uno enim vel altero naturae phaenomeno melius perpenso, non errorem solum, sed ejus quoque causam cognoscunt. Hi ex doctoribus fiunt discendi cupidi, ex dissentienti-



tientibus amici et in verum naturae tramitem deducti, in indagandis rebus cauto gressu nobiscum progrediuntur. Et eo libentius amicae admonitioni cedunt, quod et nos in dissensu illis cedimus et in erudito certamine vinci aut vincere aequè honori ducimus, dummodo certum aliquid inveniatur aut verisimilitudo magis confirmetur.

Evolvatis quaeso amici, eos libellos, quibus physicorum et medicorum controversae sententiae exponuntur et diversos dissensus effectus, vivis coloribus depictos, invenietis. In multis fastus et confidentia suarum virium, contumax opinionum defensio, injuria convitia in dissentientes conjecta omnes paginas replent, nullibi vero persuasio ex phaenomenorum claritate elucescit. Evolvatis veteres, qui ex auctoritate HIPPOCRATIS et GALENI disputarunt, qui horum virorum placitis coeci inhaeserunt, non aliorum experientiae et signis morborum certis fidem habuerunt, sed rationes phycas finxerunt, ideoque controversias anatomicas et res oculorum acie dijudicandas atque confirmandas, ex obscuris eorum verbis repetere et componere ausi sunt. Similes et forte acriores dissensus in recentiorum libris invenietis et quantum studium veri iis retardetur ac prorsus impediatur, per-

spi-

spicietis. Deprehendetis tamen alios, qui in recensendis observationibus accurati et attentissimi sunt, qui hac arte veras naturae vias detegunt et, ubi tandem ad conclusiones deferuntur, eas caute colligunt, dubitant, rationes dubitationis recensent, amicas correctiones admiscunt, pravas sententias, antea defensas, nunc melius edocti, candide deponunt, se ipsos corrigunt, alios benigne monent, in horum certe libris vera scientia physica et medica elucescit et in innumera commoda propagatur. Inventorum veritas et constantia in rerum natura declaranda nunquam magis tenetur, quam si auctores, qui antehac contrariam sententiam proposuerunt et acriter defenderunt, nunc aliorum dissensu mutati, incertis repudiatis, certiora statuunt.

Ex his intelligatis, commilitones discendi cupidi, quomodo in cultura scientiarum medico-physicarum de omnibus sapienter dubitare et tamen indefesso pede in veritatis scrutinio progredi debeatis, et moniti cognoscatis, quomodo dissensus eruditorum virorum naturae disquisitionem ejusque ad communem vitam usum juvet et facilem reddat. Normam itaque habebitis, ad quam dissensus et controversarum opinionum examen componi debeat, quo in obscuris saepe rebus tandem veritas eruatur.



Quemadmodum autem ex his patet, quo modo dissensus doctorum in scientia naturali et medicina ad optimum exitum, ad sedulam nimirum harum disciplinarum culturam, perducere debeat, sic dissensus medicorum, artem facientium, simili ratione ad confirmandam artem et salutem aegrorum converti potest, dummodo nec a virtute, nec a doctrina abhorreat. Etsi igitur ad finem orationis meae jam deductum esse sentio, audientia tamen vestra, Auditores humanissimi, me non abusurum arbitror, si de dissensu medicorum in arte facienda quaedam subjuxero. Non dicam de morosis censoribus, semper pugnantibus et nodum in scirpo quaerentibus, qui et tum molesti sunt, cum causae, symptomata et signa inde eruenda adeo aperta sunt, ut dubitationi nullus detur locus, cum remedia eligenda adeo facilia et tuta sunt, ut vix repugnantia cogitari queant. Ejusmodi dissensum in senioribus medicis interdum patienter feramus, in junioribus blaterantibus fugiamus, si vero justae dubitationis rationes obveniunt, tunc in curando attentiores sumus. In morbis complicatis, cum praesertim praecipuarum causarum ignorantia, symptomatum nimia varietas et signa inde eruenda haud raro sibi invicem contraria sunt, medici saepe ita in ambiguo relinquuntur,

tur, ut vel exercitatissimi viri optimique amici dissentiant. Qui dissensus, iis communi studio in salutem aegri conspirantibus, eo magis molestus est, quo magis in praecipiti malo saepe ex instanti subsidia sanitatis restituendae eligenda sunt, neque tempus conceditur eruditis disquisitionibus opportunum.


Fateor, Auditores, me in tam tristi aegrorum statu dijudicando saepe ipsum dubitare et, si solus curationi praesim, ita saepius ambiguum haerere, ut consilia amicorum medicorum laetus accipiam; difficillima enim res est, suam ipsius dubitationem ac velut dissensionem recte perpendere et penitus corrigere. Quod si vero eruditi et salutem aegri unice quaerentes medici in dubio rerum statu omnes animi vires in accuratam medendi methodum convertunt, haud raro in tenebris lucem et in ambiguo curationis eventu verum remediorum selectum inveniunt. Morbi nimirum initia repetunt, mutationes ejus varias perpendunt, symptomata praecipua attendunt, cum caussis conferunt et ita mutuo studio motus naturae, quamquam saepe in obscuro positos, vel moderantur vel juvant, ideoque haud raro caute experiundo ad felices curationes tendunt, nec coeci electas medendi rationes sequuntur.



Primaria nimirum medicorum cura est, in indolem morbi inquirere et ita de ejus diagnosi aliquid certi constituere. Evenit interdum, ut in complicato morbo, alius medicorum alio nomine utatur, facile tamen, si liberales fuerint et mites, in vera idea morbi conspirabunt. Si enim perpenderit, symptomata quaedam primaria, aegro prae reliquis molesta, ex una causa oriri, protopathicos et devteropathicos morbos se invicem excipere et, posterioribus se evolventibus, priores adhuc vigere posse, recte utique intelligent, in ea re non verum adesse dissensum, dummodo enim, re aliter perspecta, via ad diagnosin causae proximae aliquo modo attingatur, omnis dissensus tollitur.

Auxilium aegro ferendum tamen non citius eligitur, quam cum de prognosi enuntianda et ex suis signis comprobanda conveniat inter medicos. Arti salutari omnino opprobrio est, si unus medicorum vitam promittat, alter certam mortem praenuntiet. Quanquam enim in summa morborum vehementia vita hominis haud raro in ambiguo posita est, ideoque certus morbi eventus praedici nequit, ea tamen semper est rerum conditio, ut in alterutram partem, vitam aut mortem, magis minusque vergat aegri dispositio, qui, licet non raro morti proximus videatur,

deatur,



deatur, tamen, emergentibus interdum occultis viribus vitae, salvus et patriae et amicis redditur. Si igitur medici causas dubii eventus ex virium vitae et morbi aestimatione indicant, dissensus eorum ita coercetur, ut etiam solatio sit et aegro et amicis ejus, et ipsi medici de sustinendis viribus residuis solliciti esse possint.

Quicquid vero dubitationem quandam in judicio super praesenti et futuro aegri statu movet, illud etiam indicationem medici, sive quid in aegro praecipue mutandum sit, definire haud permittit et continuos dissensus alit. Saepe tamen in signis anamnesticis, ex causis antecedentibus petitis et inter se et cum progressu symptomatum collatis, tot indicia apparent, quae ad methodum medendi, nisi certam, tutam tamen ducunt. In nimia enim copia rerum, quae sui correctionem exigunt, symptomata aegri ipsa nos movent, ut, cum non omnia simul corrigere queamus, ad unum et alterum saltem respiciamus, ut illi mutationi prae reliquis faveamus, quae nos ad alteram eo facilius ducit. Perpendis igitur omnibus aegri incommodis, quae in universum levare debent, varia inveniuntur, quae prorsus mutari nequeant, alia, quae mutationem praecipue urgeant, in his maxime expendendis haereant



reant medici dissentientes, ulteriorem morbi progressum patienter expectent, ita paucis saepe horis praeterlapsis, aut de medela morbi desperandum esse perspicient, aut tales eventus cognoscent, quibus ad indubitata quaedam auxilia vocantur.

His autem dissensibus saepe ex voto compositis, in remediis eligendis alia rursus oritur controversia. Apparatus enim medicamentorum tantus est, ut unus medicus haec, alter illa suadere soleat et haec diversitas medicamenti exhibendi, ad dosim ipsam, propinandi tempus et intervalla extendatur. Dummodo vero medici in cognitione remediorum physico-chemica recte versati sint, dissensus facile tollitur, si perpenderit, habere medicinam remedia quaedam heroica, unica certe in suo genere, quae non mutari, sed ex bonitatis notis dijudicari et aegris pro ratione morbi temporum propinari possint et debeant; esse item alia, quae similitudinem quandam indolis viriumque habeant, ex quibus unum alteri substitui possit. Priora summe necessaria sunt, reliqua cujuslibet medici arbitrio relinquenda, exercitatus itaque medicus recte cognoscit, utrum dissentienti amico cedere, an usum selecti cujusdam medicamenti urgere debeat, ita, ut dissentiendo tandem efficacissimum remedium inveniatur.


Ex iis igitur, quae breviter a nobis indicata sunt, luculenter apparet, exercitatissimorum et amicorum medicorum dubitationibus et dissensu, ingenium ad varia remedia disquirenda excitari et iudicium acui, ut ex magno apparatu medicamentorum optima demum eligantur et in commodum magis, quam detrimentum aegri cedant.

Sed perpendatis etiam Auditores, quanta in his recte exequendis exigatur eruditionis et virtutis vis. Non ex hypothefibus et vanis nonnullorum opinionibus, experimentis vagis suffultis, sed ex ordine doctrinae nexuque omnium disciplinarum, quae verum systema medicum tradunt, res omnes aegro salutiferae declarandae sunt. Ex fundamentis artis consilia nostra eruimus et alia dijudicamus, ex iis quoque nostrae medendi rationes ab aliis medicis examinantur: nisi itaque haec in scholis medicorum iacta sint ex difficultatibus, in facienda medicina oboriundis, nos extricare haud possumus.

Animus vero medici in colenda et facienda medicina ad virtutis normam et amicitiae leges gubernandus est. Non tantum nostrae imbecillitatis memores sumus et ideo in dijudicandis rebus caute versemur, sed in iis agendis aegri salutem, conservationem, dolorum levamen unice quaeramus; mo-



res eorum, qui nobiscum finem curationis respiciunt, sive medici sint, sive alii amici, recte examinemus, omnes blanda humanitate in nostras partes trahamus et dum boni medici officium exsequimur, etiam boni civis et optimi amici exempla factis nostris serio exprimamus. Exercitium artis in se arduum et difficile, non solum aegrorum perverfis moribus difficilius redditur, sed medicorum quoque ignorantia, negligentia, pertinacia, arrogantia, iis, qui ad ultimum curationis finem tendunt, impedimenta haud vulgaria objiciunt. Ne ergo negligatis, Medici, sapientiae et virtutis studium, serio cogitetis, quam varia sint vestra officia in cura aegrorum et omnes animi vires eo intendatis, ut, quae una vestra laus est, conservatores generis humani inveniamini.



IV.

Dissertatio de topicorum medicamentorum
usu in variolis.

Variolae, morbus, veteribus forte prorsus ignotus, in ortu suo et progressu singularia omnino phaenomena offert. Ipse enim etsi in universum quidem cum morbis exanthematicis febrilibus convenit, multa tamen in inflammatoria et contagiosa sua indole et variis morbi per stadia sua mutationibus ostendit symptomata, ipsi solum propria. Cum itaque variolae attentam medicorum considerationem omnino postulent, optandum sane est, ut medicus in facienda medicina exercitatus, qui hunc potissimum morbum crebrius observavit, recentiorum medicorum scriptos hac de re libros judicio perlustraret, eo quidem consilio, ut, collatis iis, quae a recentioribus animadversa sunt, cum veterum observationibus, historiam medicam morbi variolosi conscriberet. Equidem scio, experientissimum GREDING, cum olim Zwickaviae medicinam faciebat, hujus laboris periculum facere coepisse, nec pauca in hos usus collegisse; ab eo tamen tempore, quo ptochotropheo Waldheimensi praeest, hos labores seposuit, propterea quod ob-



servationibus de curatione epilepticorum, melancholicorum et maniacorum morborum est intentus, sicut ex speciminibus in his adversariis medico practicis patet. Et profecto hic labor tanto difficilior nunc est, quanto magis inde a viginti circiter annis, insitio variolarum, antea modo tentata, varie defensa et impugnata est. Tantos enim in diversis insitionis methodis successus habuit, ut in omnibus ferme Europae linguis editi ex hoc genere libelli, deberent ab illo, qui aliquid boni velit hac de re scribere, conferri.

In univ[er]sum itaque certum est, contagium variolosum specificae sive singularis indolis esse et, semel natum, varia ratione propagari; febrem ut plurimum moderatam incendere et, maculis cutaneis efflorescentibus, inflammatis, suppuratis et tandem exsiccatis, stadia sua absolvere. Per haec stadia in hominibus de reliquo sanis, nullaque cacochymia nec subtilisata, nec maligna infectis, in discretis semper, in copiosis saepius sine multo incommodo transit, in copiosissimis et confluentibus pessima crebrius symptomata conjuncta habet, sed tum etiam in corporibus ceteroquin sanis, nec perversa medendi methodo turbatis, tardius quidem progreditur morbus, sed tandem sanatur. Si vero alia
quae-

quaedam cacochymia in corpore est, tunc illa vel interea quiescit, vel per febrim variolosam simul evolvitur et tum saepius adeo maligna symptomata succedunt, quae mortis causae sunt.

Ardua esset, sed maxime utilis, disquisitio, si in variolosis potissimum observaretur, qua ratione variae cacochymiae se evolverent, vel, durante morbo, quiescerent; sed vera indoles cacochymiarum, ex mixtione dijudicanda et idiosyncrasia hominum, his affectorum, adeo obscura sunt, ut signa, quae interdum patent, vaga maneant et maxime incerta.

Scabiem, durante morbo varioloso, evanuisse et exsiccata esse, febrim quartanam intermittentem prorsus interceptam fuisse, experientia me docuit, sed simul perspexi, finito morbo varioloso, scabiem et quartanae paroxysmos regulares rediisse. Infantes atrophicos ex acido, non subactis, in rachitidem proclives, variolis maxime discretis, nullisque symptomatibus malignis affectos fuisse, observando cognovi, morbi tamen primarii vis non fracta est, sed languores continuati post multos menses mortis causae erant. Post variolas superatas saepe ii, qui discretis affecti erant, perinde atque ii, qui confluentibus laborabant, ad languores continuatos et

mor-



morbos chronicos dispositi fuerunt. In his tamen omnibus diaetae neglectus attendendus erat. Has et similes ab amicis communicandas observationes, data opportunitate, in ordinem redigere tentabo, hac autem exercitatione usum topicorum remediorum in variolis examinabo.

Variolae ex miasmate, in humoribus suscepto et evolutó, oriuntur, verum non solum superficiem cutis, sed ipsam potius ejus texturam afficiunt. Pustulas enim veras inflammatas et suppuratione mutatas, posteaque exsiccatas, in curatione recte ordinanda non solum internis, sed externis quoque remediis adjuvandas esse, multi sunt, qui arbitrentur. Quae quidem sententia, quanquam non est neganda, tantis tamen finibus circumscribenda videtur, ut operae pretium judicemus, quosdam nunc statuere. Equidem hoc argumentum in dissertationibus academicis fusius excutiendum mihi sumseram, quod autem praevidebam, esse nonnullos ex amicis nostris, qui auctoritate aliorum medicorum commoti, saepe a me dissentirent et externa remedia crebrius adhiberent, observationes nostras cum variis doctrinae medicae capitibus contuli et brevem hanc tractationem adversariis nostris inserui, quo ii, qui contrariam sententiam observationibus convicti, tuen-

tuentur, suam medendi methodum confirmarent et nos et alios instruerent, quorum etiam monita his adversariis inferere non dubitabimus.

Disquiramus igitur primum balnea, pediluvia et fomentationes similes, ante ingressum variolarum vel iis jam imminentibus, applicanda. Quemadmodum enim in omnibus sanis, quorum etiam cutis spurcitie non nimis inquinatur, balnea, perspirationem blandam et aequalem efficientia, egregium usum habent, ideoque in variis morbis interdum calida, interdum subfrigida, interdum frigida suadenda sunt; sic etiam ii, in quibus infectio variolosa vel naturalis vel artificialis instat, a medicis judicandi sunt, utrum ad immunditiam cutis detergendam, an ad cutim densam relaxandam, an ad eam laxam roborandam varia et calore et frigore temperata balnea adhibenda sint. Neque vero de his prophylacticis balneis ulterius disputabimus, utrum aqua putealis, fluviatilis, medicata martialis, an lacte, sapone et decoctis emollientibus aut roborantibus magis medicatae redditae aquae seligi debeant; haec enim aliaque in tempore, duratione balneorum, observanda monita, curae prudentis medici plane committimus, ne argumentum, a nobis tractandum, modum excedat.

Quod



Quod si vero aegri in contagii stadio jam constituti sunt, vel eruptio variolarum ipsa imminet et febris plus minus insigni dirigitur, tunc quaestio de balneis applicandis majores habet difficultates. Si enim perspirationem blandus sudor excipit, certum est, contagii variolosi partem perspirare, partem in cute haerere et progressum morbi in hoc stadio optime succedere, quoniam mollities cutis moderata blando tepore conciliatur. Ubi vero, ut fit interdum, accidit, ut cutis sicca et febris valida reperiantur, tum emollientes fofus et balnea similia tepida exigunt, atque si cum sudore largo viscido, in cruditate adeo noxio, anxietas febrilis intenditur, subfrigido et roborante balneo magis opus est. Rebus vero sic se habentibus, atmosphaerae varietas in balneo, in quo aqua corpus ambit et in aere, postea corpus cingente, omnino maxima cum cura attendenda est, si finem nostrum assequi velimus. Leviores certe aeris vicissitudines horrores in cute tunc valde sensili excitant, quae excretionem cutaneam, in aequilibrio servandam, turbant. Febris profecto ex horrores stadio ad calorem jam progressa, novos et intercurrentes horrores difficulter admittit, propterea quod iis non solum cutis nervi stringuntur, sed nervosum systema convellitur. Id quidem con-

flat,

stat, quod corpus, post balneum moderate tectum, perspiratione blanda afficitur, calorque febrilis temperatur, attamen non semper evictum est, utrum miasma solum variolosum, an aliud simul accessorium moveatur, quod hac ratione ad ulteriorem evolutionem disponitur.

Nos quidem non latent observationes nonnullorum medicorum, qui, aere frigidiusculo admissio, vel balneo subfrigido eruptionem variolarum adjuverunt, et concedimus, horum interventu, cutem laxam roborari et febrim nimiam temperari; sed, nonne regimen moderatum in calore aeris, per conclave frigidiusculum et per stragula leviora nobis, sine multo balneorum apparatu, idem commodi praestit? nonne febris aucta potu frigidiusculo, acidis et nitrosis satis compescitur? Nobis tamen nota sunt exempla, ubi mortis subsequenter causa in balneum, tempore eruptionis variolarum applicatum, conjecta est, quanquam medicum ex signis malignitatis, in aegro simul observatis, excusare potuimus. Balnea itaque ad eruptionem juvandam suadere nolim et hic obiter moneo, et in hoc stadio praecipue medicum anxietates praecordiorum febriles ab anxietate hypochondriorum distinguere debere, hae enim clysmate magis, quam aliis auxiliis leniuntur et,
 spasmo



spasmo inde soluto, quies corporis et blanda ejus perspiratio succedunt, quibus eruptio variolarum juvatur.

Sed non est animus, aut instituti nostri, hic tantum de balneorum usu, eruptionem juvante, disserere, sed simul etiam de derivatione variolarum ad definita loca agendum est. Balnea prophylactica eruptionem in reliquis corporis partibus augere, in facie imminuere, multi sunt, qui arbitrentur, sed eventum votis non respondisse, ipsi saepe usu cognovimus. Quod vero in hunc finem balnea universalia rarius applicavi, ad meam in eo non tam experientiam, quam ad aliorum provocare possum. Applicavi autem crebrius pediluvia, moderate calida, ex aqua simplici vel cum lacte vel cum sapone et decocto chamomillae parata, sed horum etiam usum nunc non urgeo, cum crebriores in facie, pauciores in cruribus excitatas esse variolas, cognoverim. Cum praeterea aequalem semper in his morbis perspirationem urgeam, de pedibus nudis relinquendis et facie, fomentis afficienda, nunquam cogitavi. Constat enim, non omnes omnino partes, quae in morbo denudantur, sed quas semper nudas aeri exponimus, imprimis faciem, copiosissimae variolarum eruptioni obnoxias esse, idque propterea, quod
con-

consueta perspiratio in partibus tectis magis, quam liberiori aeri expositis succedit. Et profecto facies magis quam reliquae partes subtilissimis et vix conspicuis pilis obsita est, ad quos fontes humoris, cutim inungentis, conspiciuntur et in quibus eruptio variolarum major deprehenditur. Forte etiam inquieti infantes et qui stragula abjiciunt, tardiores eruptionem ideo efficiunt; quod blandus sudor, eam juvans, hoc modo turbatur.

Cum igitur morbus variolosus infantibus crebrius, quam adultioribus accidit, in his, si semper de munditie corporis solliciti sumus, de balneis et fomentationibus vix unquam cogitandum erit; tenera enim cutis fabrica in universum eruptioni favet. Addamus his unam modo observationem, quam de viro quadragenario adnotavimus, qui etsi in spurcis semper laboribus erat versatus, variolas tamen, in facie potissimum confluentes, per omnia stadia tam felici successu superavit, quamquam nullo balneo ad cutim mundandam uti potuit. Quae observatio, etsi singularis est et nihil magnopere ponderis habet, a nobis tamen ideo commemoratur, ut perspicatur, eruptionem variolarum viribus cordis et febris moderatae adscribendam esse et blandam tandem perspirationem eandem juvare.


Hh

Atque



Atque his, quae modo demonstravimus, regimen aeris externi in juvanda eruptione variolosa satis definitum nobis videtur. Dolendum sane est, aegros istos, in quibus eruptio variolarum eminet, in universa ferme Germania non modo inter rusticos et urbium minorum incolas, sed etiam inter plebejos homines urbium celebrium, quamvis in his prudentes medici veram medendi rationem ostendunt, calore conclavium et stragulorum ita urgeri, ut, profusis sudoribus, quos calor expressit, evolutum contagium variolosum, vel alia accessoria cacochymia aucta et in malignam conversa, nimis copiose ad cutim derivetur. Quando tot funera infantum ex hoc genere in nostra quoque urbe confidero, definire non audeo, utrum depravata vivendi ratio, inprimis victus inordinatus, infantes, variolis afficiendos, minus dispositos offerat, an incongruorum remediorum usus, vel denique regimen caloris, nimium applicati, eorum causa sit habenda. Accusandi profecto nonnunquam sunt medici, qui, quoniam differentiam perspirationis et sudoris non recte attendunt, a sudoribus blandis, interdum mitiores variolas concomitantibus, ad sudores viscidos, vi extortos, concludunt, nec perpendunt, sudores, in cruditate ortos, rarissime cum levamine succedere, saepiusque morbum exasperare,

atque



atque in robustioribus modo et succi plenis interdum, in imbecillis vero et macilentis nunquam salutare posse effectus ab iis expectari. Regimen itaque temperatum, ut in omnibus febribus, imprimis acutis exanthematicis, sic in variolis quoque, cutim ad eruptionem pustularum non evitandarum et ad febriles motus moderatos disponere, omnes mecum consentiunt ratione et experientia ducti medici.

Utrum vero consultius sit, aegros, in quibus eruptio variolarum instat, in quibusque saepe non ita, ut decet, succedit, liberiori coelo exponere, an aërem, ventilationis ope, per fenestras appositae admittere, difficilis est quaestio. Medici nonnulli, qui hoc affirmant, ad experientiae auctoritatem provocant, qua constare dicunt, pustulas vere prodire et quidem pauciores et discretas. Sed ad hanc experientiam rationis iudicium valde commendamus. Cordis vis, febre moderata, evolutionem contagii efficit et eruptionem pustularum juvat, si interea atmosphaera temperata perspirationi et blando sudori favet, quibus magna pars contagii dissipatur, ne omne in cute haereat, vis enim aeris frigidioris vasa cutanea non roborat, sed stringit et sudorem variolosum, quem odore saepius percipimus, reprimat. Paucae igitur prodeunt variolae, in locis,



ubi materia jam cutim ingressa erat, reliqua reprimitur. Si maligna est, certo in viscera convertitur et protinus pessima symptomata inducit, si mitior est, chronicis saepe morbis ansam praebet. Neque vero negligenda sunt febris moderatae adjuvamenta, haec enim non solum a vi cordis absoluta, nec a vi quadam intrinseca materiae morbosae, sed simul a contractione moderata vasorum, in extremis resistentium, derivanda sunt.


Quamquam nimis fortasse primae hujus tractatus parti immorati sumus, medicisque exercitatis nonnihil taedii creavimus, tamen minus exercitatis, quibus potissimum scribimus, ulteriorem ad has res attentionem summo jure suadendam putamus. Jam vero ad alia doctrinae nostrae capita progrediamur.

Multi quidem sub initium eruptionis variolarum, de oculis in posterum a labe praeservandis solliciti sunt. In summo enim inflammationis stadio habitus cutaneus, imprimis facies et palpebrae, tument, impetu vero morbi ad superficiem corporis bene directo, palpebrae omnino sine noxa clauduntur et per aliquot dies clausae manent, lacrymis semper per puncta lacrymalia ad saccum derivatis. Variolarum eruptio in margine palpebrarum majorem,

ut

ut conflat, molestiam affert et in ipso bulbo, etiam in cornea, variolas surgere observatum est, quamquam rarissime. Sed dummodo humores non nimis impuri sint, variolarum mutatio et in his partibus sine noxa absolvitur, atque etiam si cilia cadunt et levis erosio in conjunctiva remanet, tamen chronica mala non relinquuntur, nisi ophthalmiae ex aliis causis exacerbentur, vel sinistra medendi methodo exasperentur.

Topica medicamenta, quae ad avertenda haec incommoda adhibentur, vulgo usitata, sunt halitus cepearum, allii et caryophyllorum aromaticorum, quos matres, de cura infantum saepius praepostere sollicitae, oculis eorum in ipso eruptionis stadio inflant, qui vero propter irritationem valde nocent. Etsi vero et halitus seminum foeniculi vel anisi masticatorum longe mitior est, tamen et hujus applicatio supervacanea videtur, in benignis praecipue et discretis; tum vero, cum in perversa humorum mixtione malignae imminet, quaelibet irritatio in oculis excitata, acres humores ad conjunctivam allicit et inflammationem movet. Nam cum non solum morbilli, sed et alia exanthemata febrilia ideoque et variolae oculos illacrymantes reddant, id manifesto indicio est, haec miasmata



cuncta lacrymas acres reddere, minimeque convenire, ut aliquis halitu aromatico, minima vasa non roborante sed irritante, hoc incommodum avertere studeat. Et si licet provocare ad experientiam nostram, saepius cognovimus, infantes, quibus haec prophylactica auxilia sunt applicata, post variolas superatas, ophthalmias chronicas esse expertos. Contra ea multas matres, ut testes, citare possum, quae consilio meo obediens, nihil applicarunt et, quamquam oculi ob inflammatorium tumorem, per plures dies clausi manerent, iis tamen postea apertis, pristinam conjunctivae tunicae splendorem redire viderunt. Idem valet de solutione croci, oculis illita et aliis remediis. De oculorum cura in exsiccationis stadio paulo post agetur.

Pustulae variolosae in faucibus crebrius et imprimis ad uvulam et veli palatini confinia efflorescunt, quae non tantum in se anginam variolosam inducunt, sed ubi cum capitis tumore etiam collum intumescit, eam magnopere augent. Haec damna matres credulae, appensis ad collum succini frustulis vel filis gossypinis theriaca illinitis vel aliis amuletis, avertere solent, a quorum usu nulla noxa metuenda est; si vero theriacam, rob sambuci vel alia collo illinunt et cutem spurcam reddunt, tunc omnino monen-

monendae sunt, ne topicis his medicamentis perspiratio turbetur. Multo vero minus emplastra debent concedi, quippe quae etsi adhaerente acri pinguedine, ut fit interdum, non nocent, tamen cutim jam irritatam, quocunque fiat modo, magis laedunt.

Gargarismatibus et fotibus ori admittendis, ut prophylacticis remediis vix opus est; si enim tum, cum incommoda non urgent, fauces medicamentis et blandioribus etiam discutientibus nimium afficiuntur, timendum omnino est, ne, irritatione concessa, anginae generandae praebeatur occasio. Quod sic vero in progressu morbi angina variolosa incommoda infert, tunc iis aptis remediis, ex indole morbi dijudicandis, succurrendum est, quo gargarismata et fomentationes emollientes, discutientes, roborantes, aliaque remedia externa pertinent.

Variola est pars inflammata cutis in abscessum mutanda. Quaestio igitur a nobis movenda est, an abscessus maturatio externis remediis in suppuratione adjuvanda sit? Fuerunt omnino, qui, emplastris appositis, id tentare vellent *) quorum tamen tenta-

mina

*) vid. *the Gentleman's Magazin*, mense junio 1752. p. 269. ubi Cl. CAMERON emplastra, maturationem



mina nusquam confirmata videmus. Alii vero, qui fomentationes emollientes applicandas suadent, forte majorem merentur attentionem. In variolis sparsis et copiosis quoque nihil moliendum esse omnes consentiunt, sed in confluentibus haec remedia necessaria esse, nonnulli sunt, qui contendunt. Nisi vero in his vis interna ad copiam materiae morbosae in cute sustinendam sufficiat, vel per selecta remedia roborantia et antiseptica sustineatur, fomentationes parum juvabunt. In difficili confluentium suppuratione et ubi vis materiae morbosae in cute sustineri nequit, ipsi naturae motus alia offerunt auxilia. In adultis salivatio, in infantibus vero os humidum et diarrhoea morbum levant. Atque haec est causa, ob quam his naturae motibus spontaneis magis, quam artificialibus insistendum censeamus, cum egregiam videamus similitudinem in superficie faucium et canalibus intestinorum

cum

puris juvantia, artibus variolis laborantium imponere suadet et variolas a facie avertere tentat. Cl. CLOSIVS vero *in nova variolis medendi methodo*. Traject. ad Rhenum 1766. in 8vo emplastra vesicatoria simili ratione pedibus applicat. Vid. Commentarios de rebus in scientia naturali et medicina gestis. Volum. II. Part. II. p. 343. it. Volum XV. Part. IV. pag. 648.

cum cute, materiam quasi perspirabilem ex humoribus subducente. Est haec derivatio materiae evolutae cum miasmate ad colatoria maxime convenientia, in quibus quidem non haeret, sed promovetur, atque id multo melius, quam si eandem velimus ducere ad loca ea, ad quae per vires vitae non amplius duci potest. Collutiones oris itaque in salivatione et clysmata in diarrhoea melius conveniunt, quam ea, quae suppurationem in cute augent.

Quod si etiam suppurationem auctam in cute cum suppuratione vulnerum et abscessuum a chirurgis juvanda comparare velimus, idem patebit. Nam et nimia in his suppuratio, viribus tam insidiosa, saepe coercenda est, nequaquam vero augenda. Quam ob rem, unguentis digestivis pinguibus remotis, deligatio sicca vulnerum magis probatur, et, insuper purgantibus et roborantibus interne datis, suppuratio nimia derivetur et coerceatur. His de causis in variolis quoque suppuratio ultra modum augenda non est, quippe quae haud raro in progressu morbi variolosi ob partem lymphaticam, quam pus bonum conjunctam habet, corpora vehementer debilitat et enervat.

Sed quoniam abscessus, qui pure turget, debet aperiri, ne pus retentum resolvatur, attenuetur et



resorbeatur, videamus an variolae, ut abscessus, sint aperiendae? Minores variolae saepe sine pure collecto dissipantur; aliae, quae etiam verum pus contrahunt, id sub cuticula in lamellas siccas cogunt, quae cuticulam novam, subtus natam a laedente aëris attactu defendunt; aliae denique majores quidem variolae sponte rumpuntur et subsident. Ex quo cognoscimus, variolas non poni posse in numerum eorum abscessuum, qui sunt aperiendi, praeterea quod mox sub cuticula, neutiquam, uti majores abscessus sub cute in contextu cellulari haereant. Quando autem in chirurgia de abscessu aperiendo quaeritur, tunc de puris fede omnino cogitandum est, quod ex hac re resorptio puris noxia definitur. Pus, in contextu cellulari haerens, facile resorbetur, vel clanculum in sinus laterales proserpit, cutis autem densior haec incommoda arcet. Nisi igitur tales confluentes pustulas variolosas adesse videas, quae profunda ulcera formant, de pure per artem removendo non sis sollicitus.

Quod autem ad resorptionem puris attinet, non solum ad sedem variolarum in cute, sed etiam ad materiae purulentae indolem respiciendum est. Namque pus densum et spissum prorsus non resorbetur, tum etiam, cum in contextu subcutaneo
haeret;

haeret; pus autem acre tenue et malignum resorberi potest. In moderamine autem febris secundae variolosae, quae est suppuratoria, vis naturae in dirigendo impetu humorum ad superficiem corporis et in ea per varia medicinae auxilia conservanda abunde cernitur. Quando enim corpus moderate perspirat, humores ita ad habitum cutaneum diriguntur, ut resorptio vix locum habeat, si vero febris imminuitur, lentae similis, nec directiones, quas supra indicavimus, in salivatione et diarrhoea locum habent, resorptio vere efficitur et vel mortem subitam vel chronicas metastases inducit, nisi forte, quod tamen fit rarius, vires vitae iterum medicamentis incitatae humores ad corporis peripheriam ducunt, id quod in sudore, ut crisi accessoria, per aliam occasionem declaravimus. *)

Cum itaque et per incisionem pustularum resorptio non caveatur et in confluentibus fieri non possit, ut omnes variolae aperiantur, auxilium hoc vere supervacaneum est. Affirmant quidem medici, qui pustulas aperiendas esse urgent, observationes extare, quae doceant, depletas variolas iterum novo pure repleri et ita malignitatem ab internis corporis

*) vid. Dissert. nostr. de crisi variolarum accessoriis.

Lipsiae 1755. 4to §. 11.



poris partibus arceri; verum sunt et aliae similes observationes, quae ostendunt, pus non semper affluere, sed crustas potius in iis locis ficas et duras formari et in facie quidem facilius, quam in aliis locis, ubi decubitus corporis in stragulis variolas citius deprimit, nudam tamen cutim libero aeri non exponit. Quod si etiam, crustis remotis, fomentationes ex lacte et aliis emollientibus decoctis paratae, applicantur, tamen cum facies universa non semper humiditate possit affici, nec formatio novarum crustarum impeditur, nec molestiae inde oriundae multum mitigantur.

Altera quidem ratio, cur pus ex variolis subduendum esse, nonnulli arbitrantur, ad cicatrices pertinet, quo nimirum foedae erosiones et inde oriundae inaequalitates cutis impediuntur et faciei, quantum fieri potest, nitor concilietur. Si igitur pus passim sub magnis crustis haeret, hae omnino non nihil levandae sunt, quo materia, subtus stagnans, evacuetur. Hoc autem cautius debere et rarius fieri, ratione et experientia convicti credimus. Novae enim crustae oriuntur, quae cutem teneram magis laedunt, quam pus, quod sub iis haeret, quaeque propterea etiam inaequales cicatrices formant. Vidimus saepe, pure educto, carnem fungosam excrevisse,

viffe, quae vix aequaliter coerceri potest, nisi cuticula sensum papillis densioribus superinducatur et quilibet etiam perspiciet, foedas inaequalitates cutaneas in illis locis excrefcere, ubi crustae non lente fuerunt remotae, sed vi aliqua avulsae.

In locis, ubi variolae exsiccatae blande secedunt, cutis super reliquam partem, velut depressus monticulus elevatur, ex quo phaenomeno Ill. HAHNRIUS suam de evolutione vasorum cutaneorum sententiam defendere conatur. Sub pure nimirum propullulant vascula, quae per inflammationem extensa, in papillas sive parvas eminentias, cicatricem formantes, elevantur. Hae in pure vel sub ejus crusta melius excrefcunt, chirurgi enim, qui in vulneribus pus rudius abstergunt, neque tenuem ejus partem linteis carptis tantum sugunt et sanationem vulneris retardant et cicatricem cavam et irregularem reddunt. Si igitur ex variolis quoque pus prorsus tollitur, crusta generatur, quae siccescit et ita teneram cutem laedit, hinc in quibusdam locis, in quibus vasorum vis propullulat, elevationem, in aliis ubi haec vis deficit, depressionem relinquit, adeoque irregularem cicatricem format. Neque sufficit fomentationibus, quae ex lacte et aliis emollientibus paraveris, cutem teneram fovere, propterea quod
haec



hae incrementum carnis fungosae in cicatrice, adeoque etiam inaequalitatem cutis augent magis, quam impediunt.

Haec praemittenda duxi, antequam remedia, quae in exsiccatione variolarum et crustis removen-
dis externe applicanda sunt, dijudicanda mihi fu-
merem. Si quis ad desquamationem variolarum
attentus est, vere observabit, crustas eas, in quibus
pus siccescere coepit, melius succedere, quam illas,
quae ex apicibus vasorum, in laesa cute propullu-
lantium, exsiccatis oriuntur. Illae enim jam a va-
sis solutae sunt et genesis novae cuticulae juvant,
hae vasis arctius adhaerent et tenerae cuticulae gene-
sin impediunt. Quo facilius itaque in uno loco al-
tera et tertia crusta formatur, eo difficilior tamen
est separatio. Quamquam igitur consultum est, se-
parationem crustarum spontaneis motibus relinque-
re, in confluentibus tamen variolis et in quibus pus
ichorosum et saepe malignum reperitur, hoc in-
commodum nunquam evitari potest, ideoque de de-
lectu remediorum topicorum omnino diligenter co-
gitari oportet.

Aqua tepida non sufficit, ejus enim halitus sub-
ito dissipantur et siccitatem relinquunt. Emollientia
plus minus viscida et suboleosa medicamenta, lac et
olea

olea pressa, in saponem trita, rigiditatem crustarum magis demulcent. Quoniam vero perspiratio in facie quoque ad nitorem cutis restaurandum denuo requiritur, medicamenta varie praeparata non nisi summitatibus crustarum illinienda sunt, vel margines penicillo tantum tangendi. Etenim crustae rudius avulsae cutem laedunt et quodammodo sanguinolentam reddunt, in his tamen potissimum locis caro fungosa et inaequales eminentiae cutis generantur. Si itaque taediosum hunc laborem suscipit chirurgus, is bene dispiciat, utrum pus bonum, quod interdum fit, an ichor sub crusta haereat, si prius evenerit, crusta relinquenda est, donec sponte secedat, pure sensim siccato; si posterius, praestat potius totam crustam separare, quam ex una parte tantum levare. Etsi enim pars soluta non amplius cutem premit, haec tamen altera, cui crusta adhuc necitur, vehementer irritatur.

Ut autem exsiccationis stadium eo melius succedat, curandum est, ut nutrimenti ratio, in aegris, victum tunc maxime appetentibus, recte ordinetur. Femina tenerae constitutionis, venusta, quinto mense gravida, ex improvise, quod variolas se jam superasse crediderat, morbo hoc tenebatur. In hac quidem non confluentes, copiosae tamen, efflorescebant.



bant. Quae cum per aliquot hebdomadas curis domesticis agitata, noctes saepe infomnes transegisset, minus prosperum morbi progressum metuimus. Sed, omni ejus sanandae cura adhibita, intra nonum et decimum quartum diem, plenaria sanationis spes animos nostros confirmavit. Cepimus autem tunc temporis, cum motum foetus, licet debilem sensisse se nobis illa profitebatur, consilia de aegra subinde paullo largius et jurulento quoque victu nutrienda, quo foetus conservaretur, sed quamvis hac spe per aliquod hebdomadas confirmari videremur, tamen post mensem demum abortum sustinuit *), sine ulteriori sanitatis detrimento.


Cum vero jam die decimo quarto multae vario-
lae exsiccatae cernerentur et crustae passim caderent,
eae, quae in facie haerebant, novum quasi puris
affluxum admittebant, crustae vero majores eleva-
tae quidem et concretae faciem foedabant. Quan-
quam igitur chirurgus bis de die maxima cum cura
crustas levabat et materiam subtus haerentem educe-
bat, tamen carnis fungosae incrementum et inde
orta cicatricum inaequalitas non evitari poterat.

Erat

*) Foetum tunc editum vestigia variolarum, forma vesicularum depressarum passim in corpusculo ostendisse, obiter hic moneo.

Erat in his crustis una, quam saepius et attente consideravi et sub qua pus pessimae notae non inveniebatur. Hic, cum chirurgus ex inferiori parte pus educeret, crustam tamen non removeret, ea paulo post leviter tacta secessit, quo facto non solum caro fungosa succrevit, sed etiam nova crusta formata est, sexto demum die simili ratione separata novaque succedente, ita ut post sextam demum hebdomadem ultima crusta secederet et inaequalem cicatricem relinqueret. Nisi itaque haec femina ob causam singularem largius nutrita fuisset, leviores forte cicatrices in facie remansissent. Forte etiam nimia chirurgi cura, quam adhibuit in educendo pure, non tam ichoroso, quam spisso potius et bono, augendis crustis inaequalibus occasionem dedit.

Crustis secedentibus, de grato cutis nitore restituendo cogitandum est. Id autem si efficere volumus, curare nos oportet, ut facies aeri, nec frigido, nec calido exponatur, ille enim ob tenera cutis vasa maculas quasi subcoeruleas efficit, hic nimis siccatur et cuticulam ad citissimam desquamationem disponit. Optimum itaque hac in re est, si is, qui morbum variolosum superavit, imprimis si copiosis laboravit, non nisi in puriori et temperato aere versatur. Ex hac re etiam ea, quae ad faciem lavandam adhibentur,




tur, definienda sunt. Nonnulli utuntur tenui jusculo vitulino vel vervecino, interdum et decocto extremitatum et intestinorum animalium; verum etsi hoc modo humoris cutem inungentis vices supplere videntur, haec tamen juscula ob nimiam visciditatem cutem magis inquinant, quam purgant. Alii lentium vel aliorum leguminosorum seminum decocta commendant, in quibus tenuis visciditas est. Sed magis forte conducit, faciem antequam aqua pura lavetur, furfuribus tritici vel amygdalarum dulcium fricare. In hac autem re aquam fluviatilem fontanae praeferrem, illa enim unguinosi quid habet, haec cuticulam rudiùs afficit. Aqua fluviatilis purissima et frictio cum linteis albis tenuioribus magis profecto nitorem faciei conciliant, quam artificiosissimae saponum compositiones et tinctura benzoës in aqua lactescens, aliaque medicamenta cosmetica ex radice sigilli salomonis cet. confecta. Aqua mundam reddit cutem faciei, quo humor, cutem inungens, ex fontibus ad radices pilorum blande succedere possit.

Quoniam interdum accidit, ut post variolas superatas furunculi et abscessus et hi interdum profundius sub periosio contrahantur, de his etiam nonnulla monenda habemus. Cacoehymiae chronicae
diver-

diversae indolis cum febre variolosa saepe moventur, quae tamen in ejus progressu nullam molestam mutationem inferunt, et, quoniam, morbo superato, id, quod motum est, saepe oberrat et propter debilitatem a morbo vires non omnino potest dissipari, metastasi in contextum cellulosum conjicitur et furunculi contrahuntur. Simili modo abscessus in aliis locis formantur et, cum infantes nondum ossa satis confirmata habeant, sub perioestio et saepe ad epiphyses collectio materiae morbosae efficitur.

Si itaque latentis cujusdam cacochymiae suspicio oboritur, exquisita diaeta diu continuata, frictio et balneis, perspiratio sustinenda et humorum correctio medicamentis internis, quantum in debilitate post morbum relicta fieri potest, efficienda est, quo se- et excretionum vigor ubique sustineatur. Furunculi praeterea, si qui oboriuntur, emolliendi et si necesse sit, incidendi, abscessus vero inprimis profundiores omnino cataplasmatibus fovendi et cito lanceola aperiendi sunt, ne materia stagnans ossa arrodant.

Singulare hujus rei exemplum vidimus in puero septem circiter annorum, qui variolis, etsi non nimium malignis, tamen copiosis, affectus tenebatur, hanc curationem per omnia stadia bene sustinuit.




Quia vero, durante morbo, anicula, pueri curam habens, clam nutritionem non tantum largam, sed non raro jurulentam admiserat, quae in morbis acutis, imprimis variolis, mihi semper noxia visa est, post morbum superatum tumores vagi, lente inflammatorii et ad radii caput et a latere deltoidei musculi et passim oriebantur, qui tandem materiam profunde fluctuantem prodebant. In his, cum discussio per interna remedia non absolvi posse videretur; chirurgus accersebatur, qui subinde omnes incideret, quo facto semper magna copia puris tenuis, non nimium foetidi educta est, ita tamen, ut ossa nuda digitis tangeremus. Quoniam tamen parentes me et chirurgum propter crebras incisiones nimiae crudelitatis accusabant, nostraque monita, de imbecillitate et languore pueri, per accuratam diaetam et attentam curationem corrigendo, negligebant, nos dimittebant et curam pueri medicoastro tradebant, qui cum causa morbi esset sublata, laudem curationis mitioris tulit. Nulla profecto alia medendi ratio in abscessibus his profundis locum habet; nova enim metastasis ad organa excretoria v. c. renes, in ea, quae tunc est, aegrorum debilitate vix expectanda est, ideoque morbus lentus et praecipue spina ventosa subsequitur, nulla curatione corrigenda.

Raro

Raro in iis, in quibus topica medicamenta non applicantur, vitia oculorum oriuntur; in aliis vero, quorum oculi vel ab initio vel in exsiccationis stadio, medicamentis externis tentati sunt, vitia oculorum, imprimis ophthalmiae variae oriuntur. De cura itaque oculorum in exsiccationis stadio pauca commemoremus. Postquam tumor faciei et idcirco etiam palpebrarum subsidet, oculi sponte aperiuntur, si vero variolae in margine palpebrarum sitae sunt, vel conglutinatio ciliorum evenit, tunc separatio palpebrarum non sponte fit, sed cum aliqua difficultate adjuvatur.

Si igitur palpebrae ob variolas, ad illarum marginem positas, conglutinantur, coalitus morbosus persistens non inagnopere metuendus est, oculi enim liberi relictii, nec fascia adstricti liberiores motum exercent, quo membranae non valde irriterentur. Cum enim lacryma blanda affluat et margines humectet, exsiccata variolae crusta non tenaciter adhaeret, sed vel altera, vel ab utraque parte secedit, itaque non est necesse, palpebras nimis cito divellere, vel crustam, quae nondum secedere potest, emollientibus fomentis juvare. Quemadmodum enim in facie, ut supra monuimus, crustae novae oriuntur, sic ad margines palpebrarum saepe ulcera remanent.




Idem forte evenit, si cilia conglutinantur. Quod si enim aeger hoc incommodum patienter fert, lacryma affluens hunc coalitum quoque solvit. Et si accidat, ut cilia ad extremum marginem palpebrae agglutinata lacrymis solvi nequeant, cilia ipsa saepe cadunt et tum etiam sine noxa, cum nova cilia suo tempore succrescant. Nihilo minus tamen fateor, in infantibus hanc spontaneam separationem raro locum habere. Etenim hi, quamquam interdum profusis lacrymis separationem urgent, crebrius tamen vel manibus impuris, vel linteis asperis fricando, oculos laedunt et matres anxias et ipsa medicum ad topica et emollientia remedia applicanda impellunt. Haec vero si vel maxima cum cura applicantur, saepe ophthalmias vel sparsa quaedam ulcera relinquunt, quae non aliter, quam continuata curatione corrigenda sunt, haec tamen, cum frictionem non intermittunt infantes, profecto difficilis est.

Quemadmodum vero in variolis malignis, vel in cacochymiis accessoriis exsiccationis stadium et convalescentiae progressus in universum retardatur; sic etiam tum cura oculorum majoribus incommodis stipata est et luculenter apparet, rebus sic se habentibus, magis de internis remediis, quam de topicis

picis cogitandum esse. Omne diaetae regimen per plures hebdomadas diligentius ordinandum est, victus quidem jurulentus, quem vires fractae saepe postulant, parcius modo debet concedi; serum lactis vel acidum vel dulce, juscula tenuia cum herbis subamaris cocta et alia medicamenta, a quibus correctio humorum expectanda est, v. c. antimonialia propinentur. Massa igitur humorum universali, quantum fieri potest, correcta, vitia oculorum, cum ea conjuncta, subinde mitescunt et bona valetudo restauratur.

Quoniam vero non tantum in neglectu eorum consiliorum, de quibus haecenus egimus, sed saepe numero etiam sub attenta palpebrarum curatione, viarum lacrymalium et corneae vitia remanent, tunc iis rite dijudicatis curatio debet accommodari. Omnem autem medendi methodum, quam chirurgia in morbis oculorum proponit, hic repetere supervacaneum sit, propterea quod non tantum medicamenta topica, sed simul etiam auxilia chirurgica, manu et instrumentis applicanda, recensere cogeremur.

Cum itaque persuasum habeam, me satis ostendisse, topicorum usum in variolis saepius esse noxium et, si vel requirantur, in iis applicandis cir-



cum specte verſandum eſſe, ne incommoda, quae avertere conaris, magis augeas, finem huic tractationi impono. Quod ſi vero topicorum uſum durius damnaverim, certus ſum, fore, ut haec doctrina amicorum animadverſionibus magis illuſtretur et vera medicis norma in iis adhibendis tradatur.



V.

De vi cardiaca opii diſquiſitio.

Medicum non modo diaeta, curatius ordinata, ſanitatē tueri, ſed hanc quoque labefactam medicamentis ſalutaribus confirmare et debere et poſſe, neminem latere exiſtimo. Quamquam autem cognoſcimus, ea prae reliquis eligenda eſſe medicamenta, quae lente agant et naturam in ſuis operationibus magis ducant, quam urgeant, quaeque alimentis ſimilia ſint; quilibet tamen in medicina exercitatus intelligit, interdum in vehementioribus naturae motibus ſopiendis, vel etiam in imbecillitate nimia oborta ſuſtinenda heroica medicina opus eſſe, ne medicus languidus, nimium forte naturae tribuens, hanc ſibi ipſi relinquat, ideoque auxilium
frustra

frustra expectet. Atque ex his medicamentis opium est, in quo medentes, cum ejus naturam ex particulis constitutivis vix repetere possint, agendi rationem potius attendunt, ejusque vim ex observationibus constituunt.

Inter recentiores auctores, ad experientissimos viros Cl. YOUNG Anglum et Cl. TRALLES Germanum provoco, qui, viribus hujus medicamenti diligenter exploratis, id ad medicinam recte exercendam accommodarunt. Inter alias igitur vires, quas opio tribuunt, vim febrim excitandi et simul cardiacam invenio. Quamobrem cum me ab humanissimo TRALLES notatum intellexissem *) ; quod post opii usum cardiaca danda esse monueram **), cum satis evictum sit, opium vi cardiaca pollere, saepius cogitavi, num in errore aliquo verfarer et, si opium cardiacam vim haberet, quaenam esset hujus effectus causa. Placuit itaque de iis, quae hac in re observavi, breviter exponere et dubitandi rationes adjicere, quo scientia et usu artis praestantissimum Virum, vel in partes meas ducam, vel ejus monitis commotus, sententiam mutem.

Li 5

Equi

*) in Tractatu de opio Sect. III. p. 265.

**) in Diss. de diarrhoea in febribus acutis §. 14. quas prodiit Lipsiae 1754. 4to.



Equidem non nego, calorem, opio sumto, incrementum, cum et ii, qui sani sunt, inde, ut a largiori vini usu inebrientur et incalescant. Id enim saepe cum inter Mahumedanos versabar, qui opio liberius utuntur, cognovi. Uti vero inebriatio, a vino excitata, systema nervorum debilitat, sic et ex usu opii idem evenire solet. Turcae ante proelium, ut constat, opium fumunt, quo animus iis accedat, contemptusque periculorum excitetur, primis autem his medicamenti excitantis effectibus superatis, languidi cadunt et ad res agendas minus idonei sunt. Hac vi opii per experientiam cognita, praefectus quidam navis Melitensis aggressus est navem Turcicam viribus longe superiorem. Cum vero sentiret Turcas, ad proelium ineundum paratos, fumisse opium, fugam mentitus et velis expansis se subtrahere annisus est, deinde vero a Turcis per aliquot horas exagitatus, cum somnolentiam ex opio natam esse coniecisset, ad proelium rediit ipse et inimicos languidos nunc et stupidos facile vicit.

Hoc egregie ex iis observationibus patet, quae Cl. TRALLES *) declaravit. Quatuor priores forte et sexta et duodecima egregiam et excitantem vim opii

*) lib. cit. Sect. I. Cap. II. p. 49. seqq.

opii commonstrant, quinta vero et septima et reli-
 quae fere omnes funestos et maxime noxios opii ef-
 fectus ostendunt, quae certe omnia, ubi inter se
 comparaveris, cardiacam viam opii, quam laudatus
 Vir *) describit, magis infirmare, quam confirmare
 videntur.

Jam vero, antequam de his porro disseramus,
 de vera medicamenti cardiaci notione videamus.
 Utamur definitione Cl. TRALLEs, qui cardiacum
 medicamentum dicit, quod indicationi vitali satis-
 facit, seu quod efficit, ut vires vitae sibi consent
 vel augeantur **). In statu sano, in quo vires vi-
 tae ex naturali corporis dispositione pendent, opti-
 mum nutrimentum, per omnes corporis elaboratio-
 nes ductum, nutritionem et assimilationem in omni-
 bus fibris efficiens, cardiacum est praestantissimum,
 inde tamen non concludi potest, gelatinam nutrien-
 tem, ceu gluten, vires vitae solum inducere, pro-
 pterea quod in materia fluidi nervei alterum et
 praecipuum virium vitae augmentum positum est.
 Cum itaque in viribus vitae languentibus sustinendis
 etiam ad utrumque respiciendum arbitrer, indica-
 tionem vitalem in therapia generali, BOERHAA-

VIVM

*) loc. cit. p. 65.

***) loc. cit. p. 65.



VIRVM sequutus, qui cardiaca ibi proponit, in duo capita redege, ita quidem, ut primum pertineret ad conservationem virium, per alimenta nutrientia et roborantia, quibus fibra elastica redditur, alterum ad incitationem virium per analeptica et stimulantia, quae vires, a nervis pendentes, sustinent.

Quamquam autem id, quod sanguinem turgidum reddit, quod inde circulum humorum, intendit, quod febrim concitat, cardiacum dici posse videtur, tamen ex antecedentibus jam patet, hanc explicationem maxime limitandam esse, etsi enim, febre mota, circulus humorum intenditur, tamen medicamentum, quod febrim excitat, non in universum cardiacum dici potest. Nam in motu humorum celeriore, qui signum pathognomonicum febris est, ad sanguinem motu intestino turgentem et motum progressivum inde auctum respici debet. Quod si itaque vel dispositio humorum, per se ex depravata mixtione resolutionem sanguinis et inde turgescentiam efficit, moles ejus resistit, licet extremitates vasorum, quae in oscillatoriis suis motibus veram vitae vim sistunt, non semper debitum vigorem habeant. Hoc evidenter ostenditur tum, cum et a debilitate in lentis et putridis febribus, celerem pulsum percipimus, in utraque enim causa re-

solutio

solutio et turgescencia sanguinis, cum summa virium vitae prostratione conjuncta deprehenditur.

Cum de his rebus agens, cardiacam vim opii statim sub examen vocare possem, placet tamen paullulum digredi et ad uberiores hujus doctrinae declarationem, somni, vini et opii vires, imprimis quatenus cardiacae et vires vitae instaurantes dici possunt, inter se conferre.

Cardiaca vis somni certa est et omnis nutritio ad vires vitae instaurandas non sufficit, nisi accedat somnus placidus. In statu naturali languet homo in somnum proclivis, ex eo, quod vires nervorum ulteriorem elaborationem alimentorum ad nutritionem sumtorum non efficere possunt. Si igitur moderate nutritus dormit, motu intestino sanguinis in somno placido aucto, resolvuntur humores et turgent; turget enim totum corpus; ex qua re elaboratio humorum circulantium sequitur et omnes se et excretiones facillime procedunt, vel ad idoneam separationem disponuntur et tandem etiam fluidi nervei separatio efficacior redditur. Viribus etiam universis instauratis, expergefactus vim cardiacam somni experitur. Ex his itaque sine ulteriori explanatione clarum erit, cur in defectu nutritionis somnus non succedat reficiens; cur a nimia nutritione

somnia



somnus minus tranquillus minusque reficiens; cur in somno nimis protracto motus intestinus sanguinis tandem langueat et torpor succedat, ideoque se et excretiones et fluidi nervei elaboratio deficiat; cur tunc temporis exercitatio suscepta torporem dissipet et optimum cardiacum sit.

Nunc vini vires examinemus. Hominem, ex inanitione vasorum languidum, haustus aquae reficit, quod plenitudinem aliquam vasorum restituit. Vini vis ex spirituoso principio major est, facit enim, ut turgescant fluida, motumque inde intestinum augeant. Hoc vero moderate aucto, motus progressivus fit excitatior et nervorum inde excitata vis, oscillationem in minimis vasis restituit. Nimius vini potus aestum, hoc est, majorem fluidi sanguinei turgescentiam efficit, quae, ut omnia vasa distendit, sic praecipue teneriora in cerebri compage posita; secretionem fluidi nervei impedit, torporem et somnolentiam inducendo, hinc, vi vini etiam discussa, languor systematis nervosi remanet, qui blanda nutrientia et alia cardiaca requirit.

Turgescit vero et, opio sumto, sanguis, vasa distendit, quam ob rem motus intestinus augetur et febris efficitur. Quod si igitur minima solida blande oscillant et cordi moderate resistent, vel spastice

constricta a spasmo remittunt, tunc circulatio liberior et inde elaboratio humorum universa restituitur, hinc juvatur aeger et vim cardiacam experitur. Quodsi vero vis opii narcotica et somnum inducens efficiatur, tunc nervi omnino laeduntur, languent et blanda nutrientia et cardiaca damnum demum tollunt.

Quum itaque ex iis, quae modo proposuimus, ut somni naturalis et vini, sic et opii vis cardiaca intelliguntur, hanc tamen maxime limitatam esse ex iis patebit, quae in successiva operatione opii animadvertuntur. Turget ab ejus usu massa sanguinis resoluta et hujus mixtio intima turbatur. Est autem haec resolutio, neque inflammatoria, neque putrida, sed inter utramque media, vel ad ultimam inclinans. Ad inflammatoriam enim vergere nequit, quoniam contractio spastica per vim opii deleta est, ideoque summam resistantiam in vasis minimis non efficit. Cum autem nimia sanguinis resolutio in omni febre debilitatem nimiam inducat, illam etiam per febrim, ex usu opii excitatam, remanere, certum est.

In ebrio porro et in eo, qui simili modo ab opio somnolentus fit, omnia vasa et superficies ipsa corporis extenduntur, qui sensus plenitudinis dici potest



potest et ex quo omnia vasa debilitantur; quod quidem non ita diligenter attendendum censerem, nisi vasa cerebri simul distenderentur, ex qua re inertia vasorum relinquitur. Et quando etiam per somnum et in eo succedentem sudorem, turgescencia humorum sanguinisque rursus dissipata est, tamen dolores capitis, a debilitate oriundi, remanent.

Ea, quae, ad solidorum et fluidorum statum respiciendo, nunc breviter declaravi, satis ostendunt, non absolute cardiacam, sed magis debilitantem vim in opio esse, quae quidem intimam mixtionem fluidorum turbat et intimam vim fibrarum nervearum tandem quodammodo debilitat. Nihilominus tamen judico, opium posse in utroque loco, si caute fiat atque providenter et languidis interdum et spasmis adfectis propinari. Nam si vel maxime virium prostratio, quae ex opio pendet, non subitanea est, atque idoneo nutrimento, somno et exercitatione, ideoque et in aegris, ope medicamentorum vere cardiacorum quodammodo corrigi potest, tamen languor continuus inde existit.

Quemadmodum igitur inter nostros ii, qui opio perperam utuntur, languidiores sunt et ut ii, qui vino et spiritu vini abutuntur, stupidiores evadunt, sic eum quoque effectum ab opio pendere, a Turcis
ipse

ipse cognitum habeo. Inprimis vero inter hos languidam venerem ex opio oriri, ipsi, experientia edocti, confessi sunt, licet sententiam Cl. TRALLES quod opium stimulos venereos inferat *), non plane negaverim. Habet opium, nisi me omnia fallant, cum reliquis aphrodisiacis, quae stimulantia vocamus, hoc commune, ut primo impetu excitatam forte et coactam venerem urgeant, postea autem languorem ad opus venereum, nulla arte corrigendum, relinquunt.

Ex his omnibus colligo, cardiacas, seu potius excitantes vires, opio quidem non prorsus denegandas, eas tamen non absolutas, sed maxime limitatas esse. Effectus primi in turgescencia sanguinis et febre inducenda saepius incompleti sunt, ita, ut resectio inde sequi non possit. Quod si enim effectus opii massam humorum non ita resolvere possit, ut, crasi vera humorum inducta et spasmo sopito, libera circulatio restituatur, opio non reficitur aeger. Hinc parvam dosin saepius aegro obfuisse intellexi, quoniam majore opus fuerat, ad effectum, quem volueram, producendum. Languet igitur debilis aeger ab usu opii excitatus, licet
inani-

*) Traët. de opio. Sect. I. Exper. XII. p. 129.



inanitio vasorum brevi tollatur et is refici videatur; languet ab usu opii is, in quo humores nimis turgescunt et vis solidorum et nervorum impar est, iis rite dirigendis. Idque eodem modo fit in somno minus tranquillo, in usu vini immoderato, quibus omnibus debilitari tandem corpora videmus, ita ut vere cardiacis debeant excitari.

Equidem in hac re declaranda ulterius progredi nolo, pauca tamen de usu opii addenda habeo. Cum ipse ego medicinam facere inciperem, opium, quoniam tristes ejus effectus inter Turcas videram, semper veluti venenum metui, ita, ut nec aliquos quidem guttulas laudani cuiquam, nisi a WALTHERO iussus, exhiberem. Ille autem quamvis nimium opii usum in alio medico vituperaret, nonnunquam tamen heroica ista medicina uti, non dubitavit. Posteaquam monitis et exemplis hujus viri adductus, ad usum huius medicamenti et effectus satis attendere didiceram, id in morbis curandis adhibere conatus sum et, quia non male mihi cesserat, illius usum et meis discipulis commendandum putavi. Cum autem indicatio ipsa quodammodo dubia sit, et dosis etiam difficiliter definiatur, haec, quae in universum moneri posse videantur, doctrinae nostrae alumnis inculcare soleo.

Ac primum quidem si opio utendum est, medicus habeto, primas vias satis liberas esse debere, ne spasmus a mole et acrimonia saburrae, in iis retentae, oriatur. Languidi filii spasmos et debilitatem in variolis opio compescere constitueram, sed cum primae viae nondum satis liberae essent, morbus inde augebatur, donec clysmatibus, immo his non sufficientibus, laxante medicina exhibitis, spasmus cessaret, ita ut postea de alio genere cardiacorum agendum esset. Quot tristes vidi opii effectus a re-
 quie NICOLAI, quam mulierculae nostrae imperitae interdum infantibus exhiberent, in quibus vel meconium vel acquisita jam saburra intestinalis spasmodorum et anxietatis causa erat. Medicus itaque, qui opio uti vult, ante omnia, num primae viae sint liberae, inquirere diligenter debet.

Deinde viam etiam sanguinis bene examinet medicus et si plethora vera vel sanguinea, vel ipsa obesa adest, opio non utatur; facit enim plethoram extemporaneam sive febrilem. Quemadmodum enim in plethora vera non satis correcta, sic etiam in spuria ex causis morbi oriunda opium noxium est. Nimia certe fit turgescencia sanguinis, nimia febris et inde spasmus, qui tamen praecipue compescendus est, levare nequit, sed aegro anxietas affertur et



vera auxilia, quae citius applicanda fuissent, iusto serius sine fructu applicantur.

Si his viis, ut universalibus corporis, bene dispositis, ab alia irritante causa spasmi in systemate nervoso oriuntur, tunc opium exhibitum excitat circulationem sanguinis, febrim moderate auget et spasmo sopito, liberum humorum circulum reddit.

Si itaque in spasmo ab inanitione vasorum ideoque in insigni languore aegrorum, opium interdum dari posse cognoscimus, eo tamen respiciendum est, ut gradum inanitionis bene ponderemus. Si inanitio moderata est et tanta suppetit sanguinis copia, quae blande turgescere possit, tunc aliqua, licet non constans, virium excitatio ab opio expectanda est: in nimia vero debilitate solidorum, cum iactura fluidorum coniuncta, v. e. in haemorrhagiis, modum excedentibus, excitatio ab opio non effici potest. Cum autem cardiaca ea, quae vires tantum incitant, nunquam constantia sint, nisi a nutrientibus et roborantibus, vires vitae conservantibus, suslineantur, ab opio etiam ut cardiaco tali, non nisi limitatas quasdam et quasi transitorias vires cardiacas expectare possumus.

Quoniam autem non semper parvae doses opii sufficiunt, magnae vero, continuato effectu, ad
temu-

temulentiam atque soporem nimis disponunt et ita vires vitae nec sustinent, nec augent, doses magnae quidem eligendae, sed in partes dividendae sunt, ut, ex observatione medici, quavis hora, portio medicamenti opii sumi et eo usque augeri possit, donec expectatus sequatur effectus. Haec autem continuata medici observatio et ideo necessaria est, quo contraindicantia pateant et vere conspiciatur, cur opium iuuet, vel non iuuet aegrum.



VI.

Commentatio de functione vulnerum pectoris cum delineatione tubuli ad hos usus apti.

Vulnera recentia pura, sanguinis effluxu sedato, humore lymphatico, ex vasis non nihil contractis, in sano homine affluente brevi conglutinantur; impura autem suppuratione antea purganda sunt, quod blanda inflammatio labiorum vulneris et moderata febris, non solum sufficientem gelatinosi humoris affluxum et promptam puris genesin efficit, sed ichorosi quoque et forte putridi humoris, in cavo vulneris collecti, resorptionem cavet.




Si autem venenatum contagium, vel instrumento laedenti adhaerens, vel morfu animalis venenati irritati, saepe etiam rabidi, ob noxiam salivae indolem introducatur, pessima in universo corpore oriuntur symptomata et vulnera, non tam ex magnitudine, sed ex efficacia venenati contagii aestimanda sunt. Accidit enim haud raro, ut, etsi talia vulnera brevi sanentur, deleterium tamen venenum reforbeat, corpus totum inficiat et miseram mortem inducat. Suctio vulneris tunc requiritur, quam inter veteres Pnylli et Marfi ore efficiebant, non ingenta quidem genti huic contra vim venenorum efficacia, sed quod ore et labiis puris, nullo vulnere laesis, sine metu infectionis fugere poterant. Non blanda tamen suctio exigebatur, sed vehemens, quae totum vulnus sugillatione laedebat et virus susceptum, si forte non totum sugi posset, in loco laeso ad minimum coercebat. Nostris temporibus, cum chirurgi dubium hoc et forte noxium ipsis officium praestare recusent, ligaturis parti injectis, scarificatione profunda et suctione per cucurbitulas, cum multa flamma applicatas, veneni contagium, dummodo nondum resorptum fuerit, cum sanguine educere tentant. Vulneris labia praeterea irritando, digestiva et emollientia medicamenta postea applicando,

cando, largam et diuturnam suppurationem foveant, ut, si quid maligni humoris adhuc corpori insit, hoc ad vulnus derivetur et ita educatur.

Non solum vero labia vulneris depuranda et ad bonam suppurationem disponenda sunt, sed ex cavitatibus ipsis, in quas sanguis vel alius humor descendit, varia ratione et suctione etiam hic educendus est. Si humor sub calva fracta effusus est, vel cerebrum ipsum se expandens, tussi quoque et inspiratione longius protracta, cum membranis involventibus elevatum, eundem exprimit, vel partibus calvae modiolis excisis et fragmentis passim elevatis remotisque, humor extravasatus pulvillis lineis siccis fugitur, linteisque carptis blande abstergitur. In abdomine etiam profunda inspiratio, quae viscera versus parietes urget, effusos humores sanguineos, serosos et purulentos, ad ora vulneris ducit, ut effluant, et, si vulnera ampliora sunt, pulvillis etiam siccis sugantur. Simili tandem ratione humores varii morbofi ex pectoris cavo educuntur et cum in situ apto corporis pro parte effluant, pulvillis recte dispositis, in libero effluxu juvantur.

Effluxum hunc chirurgi periti attente regunt et juvant. Sub fornice calvae haerentem sanguinem reliquosque humores, quod mollem encephali fa-



bricam ejusque partes premendo soporum aliorumque pessimorum symptomatum causa sunt, protinus quidem educere tentant: cum autem novus affluxus ex vasis, acutis ossis fracti partibus laceris, oriatur, haec variis artibus removeere intendunt. In aliis cavitatibus sanguinis effluxus quidem non tam celeria et noxia symptomata efficit, attamen haemorrhagia vasorum vulneratorum non cohibetur, nisi sanguis effusus concresecat et ita thrombus, orificium vulneris obturans, colligatur. Quemadmodum igitur tum, cum sanguis vel per se, vel suppuratione mota effluit, suctio, orificia vulnerum nimis stringens, non admittenda est, ita nonnunquam tamen suctionem vulnerum salutarem fuisse, chirurgorum observationes docent.

De suctione vulnerum pectoris nobis praecipue agendum est, quod multa hic occurrunt impedimenta, quae, facili humoris egressu tardato, suctionem exigunt. Aër enim elasticus per vulnera, quae in cavum pectoris penetrant, protinus ingreditur, qui non solum labiis vulneris molestum et saepe late se expandens emphysema inducit, sed et in cavitate contentum pulmonem ita comprimit, ut ejus expansio in inspiratione humores morbosos collectos, vel medicatos, ad depurationem injectos,

nec



cum laesio, quae extravasationis causa est, in parte superiori thoracis infligitur, humores in pectus descendentes nullo alio modo educi poterunt.

Durum quidem videtur vulnere thoracis molestissimo, non raro cum costarum fractura conjuncto, aliud adjicere: non solum enim situs aegri sic incommodus redditur, sed febre etiam valida, inflammationibus et suppurationibus adeo agitur et debilitatur, ut noctibus insomnibus vexatus, blanda autem refectione destitutus, sanationem vulnere bonorum humorum elaboratione juvare nequeat. Hinc etiam si, ut saepe fit, ex vulnere aliquid sanguinis, vel geniti postea puris, in thoracem defluit, tentandum omnino est, num situs aegri ita ad vulnere directionem accommodari queat, ut materia, latendo et quiescendo noxia futura, viam effluendi inveniat. Chirurghi itaque monendi sunt, ne vulnera thoracis, etiam leviora, turundis nimium obturent, vel pulvillis, quibus medicamenta illiniunt, arcte admotis exitum collecti humoris corrupti ipsi impediant. Et quamquam tubulos, ex orichalco vel alio metallo fabrefactos, ad materiam derivandam in vulnera immittendos, non probamus *), quod labia vulnere

ris

*) Horum delineationes exhibuit IOHANN SCVL-
TETVS

ris callosa reddunt et raro plus humoris educunt, quam quantum sponte ex vulnere emanaturum erat, in levioribus tamen thoracis vulneribus linteolum, cujus margo in fila resolutus est, ad sugendam materiam effusam sufficere credimus. Quod si vero in disquisitione vulneris copiosior humor propullulet, isque ob febrem simul motam nimis validam saniosus et putridus reddatur; quod si porro ad diluendos humores stagnantes liquores mundificantes, ex scordii et agrimoniae infuso cum melle, terebinthina, vitello ovi soluta, vel liquamine myrrhae remixti, vel alia ratione praeparati, injiciendi sunt, non satis effluunt, nisi iterum per suctionem vulneris evacuentur.

Etsi vero *SCVLTETVS* *) cannulam ex auro fabrefactam plurimis foraminulis perforatam et siliolum similem priori immittendum delineat ac describit et materiam purulentam aliamque ita educi posse perhibet, tamen quomodo parvo hoc instrumento, nullo embolo instructo, suctio fieri possit, non intel-


TETVS in *Armentario chirurgico*. Tab. XII. fig. 12. 13. 14. 15. et *LAVRENTIVS HEISTER* in *institutionibus chirurgicis*. Tab. II. fig. Q. R. S. item tubulum similem argenteum flexilem. Tab. V. fig. 9.

*) l. c. p. 8. Tab. cit. fig. 9. et 10.



intelligo. Quam ob rem inventum DOMINICI ANELL *), qui siphoni tubulos, in amplum orificium variae figurae extensos adaptare jubet, quo instrumento ad vulneris ambitum fortius appresso, factio humoris ex thorace perficiatur, quoque commemorandum est. Quanquam vero rationem et methodum suctionis vulnerum abunde declaravit et apparatus huic operationi aptum tribus tabulis declaravit, tamen, ut nobis videtur, operosius in hac re versatur et labia vulneris pressione nimia et repetita irritat. Quod si vero ejus methodus non prorsus improbanda esset, apparatus tamen ad hanc operationem necessarius, amplior est, quam qui chirurgus, vulnera tractanti, commodus esse possit. Suctionem hanc quovis tubulo, ad sugendum apto, in thoracis cavum immisso, ore chirurgi optime fieri posse, patet; quoniam autem haec sugendi methodus

*) vid. Libellum *l'art de succer les playes sans se servir de la bouche d'un homme.* qui et Amstelodami prodiit 1707. 8vo. Siphonem et tubulos adaptandos quoque delinearunt HEISTERVS l. c. Tab. VI. fig. 8. et 9. et *Descrizione degl' instrumenti, delle machine e delle suppellettili raccolte ad uso chirurgico e medico,* dal P. Don IPPOLITO RONDINELLI Ferrarese opera di Don MAURO SOLDI Bresciano. In Faenza 1766. 4to maj. p. 35. Tab. XXVI. fig. I.


 dus non tantum ingrata, sed etiam noxia est. instru-
 mento quodam in hos usus invento, hoc commo-
 dius fieri posse nunc declarabimus.

Vir triginta quatuor annorum, ad melancho-
 liam pronus variis de causis aucto moerore, sibi
 manus violentas intulerat; forfice nimirum sat cras-
 so inter sextam septimanque costam sinistram a la-
 tere sterni, vulnus pollicis unius cum dimidii latitu-
 dine sibi inflixerat. Cum nullum majus vas sangui-
 ferum laesum esset et parum sanguinis ex vulnere
 efflueret, opinio quoque erat, parum vel nihil in
 thoracem defluxisse; respiratio enim libera et aequa-
 lis erat et aeger, quamquam animo minus tranquil-
 lus, de anxietatibus, ex corporis dispositione pen-
 dentibus, non conquerebatur. Vulnus igitur ut
 recens tractabatur, pulvillis, digestivis inunctis, le-
 viter impositis, recteque munitis, ne in thoracem
 gliscerent: suppuratio enim juvanda erat, quod for-
 ficis rudi impulsu vulnus non scissum adeo, sed non
 nihil contusum apparebat. Sanatio quidem ex voto
 successisset, si aeger corporis integro habitu et ani-
 mo tranquillo fuisset; multa tamen, quae curatio-
 tionem impedirent, se offerebant. Febris incen-
 debatur, non inflammatoria, quae pro conditione
 vulneris tantum exigua fuisset, sed fere putrida, cu-
 jus



jus caussa in antecedenti et minus ordinato vitae genere et imprimis vehementissimis animi pathematibus, quibus agitari solebat, posita erat. Medicamenta, quae ei utilia esse poterant, diluentia, anti-phlogistica, laxantia ac antiseptica et ipsa clysinata, vel prorsus non, vel sine ordine admittebat, victu vix ullo utebatur et potum quoque parcius hauriebat. Nulla praeterea ratione ad situm tranquillum corporis adigi poterat. Vel enim inquietus in lectulo jactabatur, vel per plures horas in conclavi anxius obambulabat, quam ob rem non solum sanies ex vulnere in thoracis cavum descendebat, sed alii quoque perversi humores ex corpore eo confluebant.

Haec itaque humorum colluvies, ob situm lateralem neglectum, nec sponte effluebat, nec effluxus ejus, linteolo fimbriato immisso, satis juvari poterat, imprimis cum ad eam eluendam et humorum putredinem cavendam infusum herbae hyssopi et agrimoniae injiciendum esset. De educatione igitur folliciti et Anelliano instrumentorum apparatu destituti, eorum usum in fugendis vulneribus tentare non poteramus. BREVERVS ergo, chirurgus scientissimus, quem in institutionibus chirurgicis §. 973. laudavi, tubulo anatomico in pectus immisso,

missio, ore fugebat, id quod aliquoties fieri patiebar; sed foetore ingrato percepto, cum aeger interea, morbi putridi gravitate aucta, purpura maligna laboraret, chirurgum fugentem in vitae periculum conjici nolebam. Is vero tubulo medio primum adaptabat vitrum cavum, ut humor fugendo eductus in vitrum descendere posset: sed quoniam ore plus fugebat, quam in vitrum descenderet, illa spe excidimus. Mechanico itaque consulto, laminam quandam in tubulo ita fiximus, ut, cum aer per forameum parvum, post laminam relictum, ex lagena vitrea affixa fugeretur, ante laminam formatus canalis omne fluidum, ex pectore educendum, in lagenulam transmitteret, quae, cum per cochleam ad tubulum aptata esset, removeri tandem et depurari poterat.

Fateor equidem, ne sic quidem halitum omnem putridum et forte contagiosum futurum, ab ore chirurgi auerti posse; tenendum autem est, non in omnibus aegris humorum adeo foetidum confluere, quam in eo, quem tunc tractavimus, inprimis si putredo injectionibus blandis, eam corrigentibus, et ea ratione halitus noxii quoque temperentur. Chirurgus tandem, qui fugit, os non tantum aqua tepida eluat, sed fauces etiam gargarisando purget, quibus



quibus auxiliis damnum, ex halitu impuro metuedum, prorsus avertitur.

Sed suctionis labor et metus suscipiendi putridos halitus, a chirurgo prorsus declinari posset, si ad tubulum nostrum siphon, eodem, quo ANELLIUS docuit, modo, applicaretur; vel si siphonibus tubuli variae figurae in extrema parte foraminulis pertusi adaptarentur *), quorum ope humor educi posset; suctionem autem, ore factam, blandam et aequalem esse, quilibet concedet, quae si siphone peragitur, semper interrupta est. Parum enim aeris, embolo reducto, ex lagenula educitur, quamobrem instrumentum mox removendum et embolus denuo adigendus est. Quod si etiam siphon ita construeretur, ut alternis vicibus embolus reduci et iterum adigi posset, aere per foramen laterale expresso, vereor tamen, hac ratione aerem, ut subtilissimum fluidum, nimium in thoracem irrepere, ideoque corruptionem humorum et noxam, inde pendentem, augeri. Instrumentum itaque accurate delineatum, ejusque usum judicio exercitatissimorum chirurgorum lubenter submittimus. In instrumentorum enim chirurgicorum inventionibus, eo respiciendum

*) vid. HEISTER loc. cit. Tab. VI. fig. II. SOLDI Tab. XXVI. fig. 2. 3. 4.

dum est, ut simplicia nec nimis composita sint, ne ingenium in iis magis se ostendat, quam genuinus usus.

Tabulae Explicatio.

- Fig. I. A. B. Tubulus ad sugendum aptus.
 C. Media eius pars perforata et ita adaptata, ut
 D. Lagenula, mediante cochlea, ei applicari possit.
 a. b. Segmentum tubuli nunc describendum.
- Fig. II. a. b. Segmentum tubuli integrum.
 c. Canalis, ex medio tubulo in lagenam descendens et cochlea, cui lagena affigitur.
 d. Foramen parvum, aerem ex lagenula in tubulum transmittens.
- Fig. III. a. b. Segmentum tubuli perpendiculariter dissectum, quod interiorem fabricam ostendit.
 c. Diaphragma seu lamina, medium tubulum intersepiens.
 d. Canalis a parte anteriori.
 e. Foramen a parte posteriore septi.



VII.

De sulphuris venerei viribus et efficacia in
curanda epilepsia habituali. Auctore
I. E. GREDING.

Et si internus medicamentorum ex cupro praeparatorum usus, caute admittendus, nec paucis fallax atque suspectus, visus est, fama tamen, quam HELVETII quondam antepilepticum puerorum, vel testante Ill. BOERHAAVIO a), e seculo superiore jam adquisiverat, quamque Cl. WEISMANN de sale suo, ex prioris tinctura coerulea elicito, in profliganda epilepsia habituali, multis encomiis exornaverat b), una cum miserrima aegrorum, tam diro tamque diuturno morbo laborantium, conditione, me iam dudum commoverant, ad cupri vires, in debellando hoc herculeo morbo, paullo curatius examinandas. Eventus autem, qui Cl. LECHANDELIER cum sale hoc antepileptico Weismanniano, in quatuor epilepticis, minus prospere ceciderat c), consilii mente agitati executionem
ali.

a) Element. Chem. Tom. II. Process. CLXXXIX.

b) Nov. Act. Physico-Medic. Acad. Caes. Nat. Curios. Tom. I. Norimb. 1757. 4to. Artic. 67. p. 276. seqq.

c) Journal de Medecine cet. par M. VANDERMONDE. à Paris. Tom. XI. Juillet. 1759. p. 45. seqq.

aliquamdiu retardavit. Cum vero novum quoddam antepilepticum, hoc nostro demum seculo, ut iactabatur, e cupri et mercurii connubio detectum, ac Celeberrimorum in arte medica Virorum experimentis comprobatum, a Cl. PASQUALLATI d) esset propositum, istud, ineunte decembri, 1766. statim ipse praeparandum curavi.

Dimi-

d) vid. Additamentum Dissert. med. inaug. de Epilepsia, auct. IOSEPHO BENED. PASQUALLATI, Tergestino ex littore Austriaco mense Augusto 1766. Vindobonae Typ. Ghelen. 8vo. Et cum forsan minus cognita sit, liceat hic eius formulam suppeditare.

„Rec. Vitrioli cyprii unc. XVI. solve leni calore
„in s. q. aquae pluviae, dein filtro depura.

„Huic solutioni impone, in vase vitili vitreato plano,
„lamellas ferreas tersissimas, quas ibi relinque per
„viginti quatuor horas. Cuprum dum invenitur par-
„tim laxè cohaerens lamellis ferreis, partim in fundo
„vafis.

„Deterguntur nitide lamellae et denuo immittuntur
„huic solutioni, sicque pergitur, donec omne cuprum
„praecipitatum fuerit.

„Cuprum hoc saepius abluatur aqua pura, dein sic-
„catum servetur sub titulo *Cupri Virginis*. Ex un-
„ciis XVI. vitrioli cyprii in experimento, hac methodo
„instituto, collectae sunt unciae tres, drachmae quin-
„que et scrupulus semis cupri virginis.

Ll 2

„Rec.



Dimidia autem libra vitrioli cyprii, paucissima grana supra sesqui unciam cupri virginis largita est. Huius sesqui uncia exacte ponderata, cum unciis quinque et drachmis duabus mercurii, ex cinnabari resuscitati, ita, praescripto modo, in amalgama redigebatur, ut drachmae duae inter miscendum perde-

„Rec. Cupri Virginis unc. iij. Mercurii destillando
 „puri redditi unc. IX. Diu terantur simul in mortario
 „vitreo, cui parum ignis debet supponi, ut caleseat
 „modice; tunc mercurius incipit lentescere et cupro
 „uniri ita, ut integre dispareat mercurius et amalga-
 „ma fiat.

„Hoc facto, additur aliquid mercurii, qui terendo
 „illico disparet; addebatur iterum aliquid mercurii,
 „qui similiter disparebat brevi. Tota quantitas mer-
 „curii misti cum unciis tribus cupri virginis erat unc.
 „XII. cum semisse.

„Hoc amalgama digestum fuit per mensem in parva
 „cucurbita in arena calore centum graduum. Amal-
 „gama tunc redditur fuscum, pulverulentum, quod
 „tritum cum aqua pluviae, dat pulverem ex viridi ni-
 „gricantem copiosum, qui siccatus servatur sub nomi-
 „ne *sulphuris cupri*.

„Dosis Celeberr. Viror. experimento confirmata, est
 „grani unius per diem mane sumendi, quandoque ad
 „grana duo extenditur, ac posset fortassis etiam, pro
 „morbi aegrique ratione tentari exhibitio plurium.“

perderentur. Hoc ultra dies triginta, calore centum ad minimum graduum digestum, posteaque aqua pluvia tritum, nonnisi drachmas tredecim cum scrupulis duobus pulveris ex viridi nigricantis, sulphur cupri dicti exhibuit. Ex reliquo amalgamate unciarum quatuor et drachmarum fere sex, quod, trituratione quam diutissime protracta, nullum pulverem suppeditabat, quodque a medio ianuar. 1767. usque ad initium martii 1769. super fornace pistoria, quotidie, ad panem aliquoties coquendum calefacta, denuo digestum, sat diu molle tactuique cedere perstitit, tandem vero duritiem lapideam induit die 10. martii 1769. Aqua pluvia diutissime tritum, vix drachmam dimidiam sulphuris sic dicti cupri obtinui, remanente amalgamate ponderis unciarum quatuor et trium drachmarum, quod eodem loco repositum, ulteriusque digestum anno post, trituratione denuo instituta, aquam quidem nigricantem reddidit, in filtro autem vix quicquam pulverulenti reliquit.

Experimenti gratia cani nigro minori villosa esurienti d. 24. ianuar. 1767. tempore matutino, nil nisi panis frustulum, granis tribus huius pulveris conspersum, atque pauxillo butyri superillitum, devorandum praebui. Optime exinde valuit per



totum diem. Deglutito autem d. 25. ianuarii scrupulo huius pulveris dimidio, eadem ratione occultati, bis vomuit quidem, circa meridiem tamen cibum adpetiit, beneque valuit. Mirabar ideo, longe minorem dosin granorum quinque d. 26. ianuarii eidem non solum crebriores vomitus cievisse, sed eum etiam languidum humi prostratum, nec in pedes surgere valentem, nec quidquam adpetentem, reddidisse. Quae omnia tamen, ingesta uncia olei olivarum, brevi evanescebant ita, ut paullo post longe alacrior factus, circa meridiem rursus cibum adpeteret et die sequenti, nullo accepto pulvere, bene valuit. Cum vero tria huius pulveris grana d. 28. et 29. ianuarii, quolibet mane eadem ratione data sanitatem eius nullo modo immutarent, eum d. 31. ianuarii sanum vegetumque dimisi.

Sulphur hoc dictum cupri cum parva aequali quantitate mucilaginis gummi arabici et syrupi de poeonia ita in pilulas redigendum curavi, ut quaelibet granum unum eiusdem contineret, aegrisque epilepticis eo commodius quolibet mane debita dosis porrigi posset. Usi vero sunt hoc remedio septem epileptici, in quorum morbi descriptione mihi ideo brevior esse licebit, cum eorundem historiae iam alibi satis descriptae inveniantur. Initium autem fecit

1) Ho-

1) Honestissima virgo viginti circiter annorum, cum ob epilepsiam, inter belli turbas a terrore anno 1757. contractam, mense augusto 1765. Ptochotropheo Waldheimensi infereretur e). Variis iam antea frustra tentatis, spes quoque illam, morbo mensuris erumpentibus solutum iri, frustrabatur. Haec enim d. 14. decembris 1765. primum et hinc semper fat regulariter riteque promanantia, nec in morbi vehementia, nec frequentia quidquam immutarunt. Superatis itaque d. 4. februarii 1767. duobus vehementissimis epilepsiae paroxysmis, a d. 5. februarii usque ad d. 6. iunii drachmas duas sulphuris cupri, quolibet mane scilicet pilulam unam deglutivit. Die 5. et 6. februarii dimidia circiter hora post deglutitam pilulam, aquam cum pituita, d. 7. pituitam viridescentem et d. 21. februarii perparum evomuit, alvo inter haec, totumque curationis tempus, nec strictiore nec laxiore reddita. Quodsi vero post deglutitam pilulam, tantillum panis, butyro illiti, comederet, nausea tantum, sine ullo subsequente vomitu illam invasit. Die 11. apri-

Ll 4

lis

e) Cum plerique horum postea stramonii extracto usi sint, cuius effectus in Advers. hor. Medic. Pract. Vol. I. P. II. descripti leguntur, huius morbi historia sub no. 28. pag. 292. uberius exposita invenitur.



lis vix deglutita pilula subito per breve tempus sensuum et cogitationum expertus fuit, post lenem deambulationem demum ad se rediit. Menstrua d. 20. februarii, 31. martii et d. 8. maii rite, d. 6. iunii vero nimis parce accesserunt. Mitiores interea epilepsiae insultus quadraginta et quod excurrit, quandoque bis vel ter de die (d. nimirum 5. 7. 11. 13. 14. 15. 23. 24. 26. 28. februarii, d. 4. 12. 15. 24. martii, d. 1. 15. 16. 17. 25. 30. aprilis, d. 1. 8. 12. 15. 19. 24. maii, d. 2. 3. et 4. iunii), fortiores autem, quia et vehementissimos, quindecim (d. scilicet 11. 19. 22. martii, d. 8. 9. aprilis, d. 5. 9. 10. 20. 21. maii et d. 1. iunii) experta est, quorum ille, qui d. 10. maii noctu accedebat, electo illam excussit. Cum igitur hoc remedio nihil plane allevaretur, die 6. iunii, instantibus mensstruis, ab ulteriore continuatione exclusa est.

2) M. E. R. viginti trium annorum innupta f) a d. 14. februarii usque ad d. 6. iunii 1767 grana 113. sulphuris cupri, totidem pilulis, ita deglutivit, ut nec nauseam, nec vomitum. nec alvi laxitatem inde experiretur. Die 22. martii post fortio-rem epilepsiae insultum menstrua consueto copiosiora accesserunt. Levioribus saepissime, fortiori-
bus

f) vid. Advers. Part. II. no. 27. pag. 289. seq.


bus vero epilepsiae paroxysmis novies (d. scilicet 6. 12. martii, d. 3. 28. aprilis d. 18. 24. 26. 27. maii et d. 3. iunii correpta, nec a scabie sicca d. 22. februarii sponte erumpente, nec a sulphure cupri ullum levamen sensit, hinc eidem d. 6. iunii ulterior huius remedii usus denegabatur.

3) D. E. Z. feminae triginta quinque annorum, ex anno aetatis tertio, quo vehementiore tonitru perterrebatur, epilepsia laboranti g), a d. 7. martii usque ad d. 6. iunii 1767. drachmam unam cum dimidia sulphuris cupri, nonaginta pilulis, exhibui. Prima autem pilula, matutino tempore vix deglutita, tam vehemens nausea, tanque diuturnus fortisque paroxysmus epilepticus ortus est, ut non nisi hora tertia pomeridiana finiretur. Die 15. martii semel et d. 16. maii saepius sponte vomuit, d. 18. aprilis autem de oris tantum amaritie conquesta est. Menstrua d. 15. martii et d. 8. aprilis iusto copiosius, d. 6. maii et d. 2. iunii vero rite accesserunt. Post primum vero d. 7. martii adeo vehementem epilepsiae paroxysmum, undecies insuper (d. scilicet 10. 17. 31. martii, d. 1. 15. 16. 23. 26. 30. aprilis, d. 18. maii et d. 3. iunii) vehementissimos et maxime diuturnos epilepsiae paroxysmos, septem, de-

Ll 5

cem,

g) loc. cit. no. 31. pag. 299.



cem, duodecim, quin imo et octodecim horarum spatium sine ulla vix conspicua intermissione, maximaque artuum atque capitis concussione durantes, experta et hinc ab ulteriore hac curatione exclusa est.

4.) C. S. F. epileptico-maniaca h) viginti octo vel novem annorum, a d. 8. martii usque ad d. 27. maji 1767. scrupulos quatuor sulphuris cupri, octoginta circiter pilulis, absque nausea deglutivit, d. 10. aprilis autem vehemens, ipsi non inconsueta, alvi adstrictio cum magno corporis calore et d. 14. aprilis post pilulae deglutitionem, vomitus spontaneus accessit. Inter haec vero decies (d. scilicet 16. 18. 24. 26. 27. martii, d. 14. 21. 27. aprilis et d. 27. maji) sat fortibus epilepsiae paroxysmis correpta, nullo modo persuaderi potuit, ut in his pilulis amplius utendis perseveraret.


5.) I. S. F. epilepticus viginti sex annorum i) a die 19. mart. usque ad d. 22. augusti 1767. scrupulos fere octo sulphuris cupri, centum et quinquaginta

h) vid. Advers. Med. Pract. P. I. de Extr. Hyosc. no. 38. pag. 105. Eadem quoque medio decembris 1768. stramonii pilulas vix biduo sumsit, animoque iam longe hebetior est.

i) loc. cit. Part. II. no. 32. pag. 303.

ginta sex pilulis deglutivit, nec nauseam, nec vomitum, sed potius aliquoties magnam alvi adstrictionem, atque inter haec novies leviores spasmos (die scilicet 21. 28. aprilis, d. 5. maji et d. 17-22 augusti) frigora et dentium stridores, quater autem (d. 14. aprilis, 28. maji, 27. iulii et d. 22. augusti) vehementissimos epilepsiae paroxysmos sustinuit, nulla-que mutatione orta, ad hunc usque diem de reliquo sat bene valet.

6) Nobilis e generosa stirpe oriundus juvenis viginti et quod excurrit annorum, e quatuordecim retro annis, quolibet mense, semel, bis vel ter, uno vel pluribus epilepsiae paroxysmis vexatus, omnibusque contra hunc morbum a variis, iisque usu praestantissimis medicis iam frustra tentatis, tandem etiam hoc remedio a d. 12. maji usque ad d. 17. octobris 1767. uti coepit ita, ut sensim scrupulos octo, 160 pilulis, deglutiret. Nullam fere nauseam excitarunt, inter eius vero usum haemorrhoides a d. 24. usque ad d. 28. maji fluidas cum larga d. 27. maji diarrhoea expertus est. Initio septembris per intervalla, horam vel integram durantia, pituitam tussi cum intermixtis parvis globulis, materiam albam, plerumque foetidam continentibus
pri



primum k) exscreavit et d. 9. septembris magnam pituitae copiam evomuit. Leviores epilepsiae insultus eum novies (d. scilicet 14. maji, d. 20. iunii, d. 1. 2. 3. 24. iulii, d. 15. augusti, d. 30. septembris et d. 6. octobris) vehementes vero paroxyfimi decies septies (d. 13. maji, d. 8. 9. iunii, d. 11. 12. 13. 14. iulii, d. 9. 18. 19. augusti et d. 7. 8. 9. 29. septembris invaserunt. Hinc nullo levamine orto, ulterior curatio d. 17. octobris intermissa est.

Inefficacia igitur huius parvae dosis satis perspecta, maiori ferendae, ut nihil intentatum relinquerem, aptissimus omnino videbatur.

7) G. C. robustissimus, vere, ut vulgo dicitur, quadratus et voracissimus homo, triginta annorum, qui nono aetatis anno epilepsia adeo gravi affligebatur, ut, quotidie aliquoties miserrime convulsus, in magnam tandem animi hebetudinem incideret. Omnibus igitur contra hunc morbum iam frustra tentatis stramoniique extracto a d. 3. februarii, a d. 4. martii 1769. sine ullo levamine sumto l), eidem, praevio dato laxante, d. 22. martii pilulam unam, d. 23. 24. et 25. quotidie duas, d. 26-29. quotidie

k) Idem postea saepius factum est. conf. loc. cit. no. 26. pag. 287.

l) loc. cit. no. 19. pag. 277.

die tres, d. 30. et 31. martii quotidie quatuor, d. 1. aprilis quinque, d. 2. tres, d. 3. et 4. prorsus nihil, d. 5. unicam, dein vero a d. 6. usque a d. 29. aprilis quotidie duas, mane nimirum et vesperti unam pilulam exhibui, ita, ut his triginta septem diebus in univrsam plus quam scrupulos quatuor sulphuris cupri, octoginta duabus pilulis, deglutiret. Harum usus nec nauseam, nec vomitum excitavit, post primae autem pilulae deglutitionem, praeter consuetudinem ad meridiem usque prorsus nihil ciborum adpetiit, adpetitu d. 25. martii demum in integrum restituto. A d. 27. martii alvum quotidie quater vel quinquies laxiorem deposuit, beneque semper dormivit. Posteaquam autem d. 1. aprilis quinque pilulas deglutiverat, epilepsiae paroxysmi per aliquot dies adeo exasperabantur, ut, cum vehementissimi essent, illum, e lecto excussum, laugentem stupidumque relinquerent, urina inter haec praeter consuetudinem inscio aegro secedente. Dosi igitur imminuta aeger a d. 9. ad d. 22. aprilis, mitescens paroxysmis, pro morbi ratione, optime valet; a d. 23. vero usque ad d. 29. aprilis denuo longe vehementiores et frequentiores revertentur, ita, ut ab hoc remedio nec aucta, nec imminuta dosi, ullam morbi allevationem observare possem.

Intra



Intra hos enim triginta novem dies, octoginta accessiones leviores (d. scilicet 24-27. 29-31. martii, d. 1-3. 5. 7. 8. 10-18. 20-23. 25. 27-29. aprilis) et quadraginta sex paroxysmos fortiores (d. scilicet 22. 23. 26. 27. 30. 31. martii, d. 1-3. 6. 16. 17. 21-25. 27-29. aprilis) expertus est, qui d. 2. 3. et 27. aprilis praesertim et frequentissimi et omnium vehementissimi observabantur.

Cum igitur HELVETII sic dictum antepilepticum puerorum et WEISMANNI crysalli venereae antepilepticae tam crebriores vomitus, quam vehementiores alvi purgationes m) excitaverint, hoc certe consilio venereum sulphur longe tutius, mitiusque egisse deprehenditur. Subitanea enim per breve tempus sensuum obnubilatio (no. 1.) et haemorrhoidum fluxus, cum globulorum excreatione (no. 6.) huic remedio nequaquam tribui posse videntur. Unicus tantum ex eius usu adpetitum (no. 7.) aliquamdiu imminutum sensit; duae insigniorem nauseam (no. 1. et 3.); quatuor vomitum (no. 1. 3. 4. 6.); duo alvi purgationem (no. 6. 7.); totidemque notabilem quamdam alvi adstrictionem (no. 4. 5.) exinde perceperunt. Nec menstruorum negotium a cupri sulphure turbatum esse
perspi-


m) conf. loc. not. a) et c) citat.



perspicitur (no. 1. 2. 3.), licet illa interdum paullo copiosiora promanaverint. Ceterum autem praecedentes septem historiae satis superque demonstrant

Hoc cupri sulphur

tam parva, quam auctiore dosi, nec in curanda, nec in sublevanda epilepsia habituali quicquam valuisse.



VIII.

De morbis epidemicis vernalibus observationes singulares.

*E*t si vernali tempore in nostro climate morbi, epidemicè grassantes, ex constitutione hiemis frigidioris et siccoris vel tepidioris et humidioris judicandi sunt; etsi febres catarrhales leni sudore gravedine et coryza crebriusque tussi et rejectione pituitae plus minus viscidae et acris brevi finiantur; etsi vernalis aura, libera respiratio et aliqua exercitatio corporis, curationem horum morborum maximopere juvat; etsi ab iis, qui, vitae laboriosae dediti, corpora omnibus aeris vicissitudinibus et injuriis exponere solent, accessiones plurimum morborum vernalium saepe patienter feruntur, atque sine consilio medici et saepe sine usu medicamentorum trans-



transeunt: medicorum tamen attentio et in his non prorsus intermittenda videtur. In univēsum enim non solum initia leviorum morborum, diaetae potissimum neglectu in graviores acutos et chronicos convertuntur, sed et dispositiones singulorum hominum, quibus unus prae altero ad hunc vel illum morbum inclinatur, caute dirigendae sunt et mutandae, quo vehementiores impetus avertantur. Quamobrem medici, quibus in familiis quibusdam cura sanitatis commissa est, vernali potissimum tempore examen inflituant et methodum medendi ad morbos venientes et haud raro clanculum obrepentes accommodent.

Id autem si quis rite efficere velit, eum oportet hiemis et veris vicissitudines diligenter considerare. Hiems enim tepidior et humidior, cujus vicissitudines sanitati tam infensae videntur, ideoque futuros morbos vernaes pronuntiant, saepe sine noxa est, dummodo venti, aerem agitantes, putridum quasi statum atmosphaerae corrigant. Hiems quidem frigidior et siccior, quae climati nostro magis accommodata reperitur, majores insidias sanitati struit, si vernale tempus humidum et calidum ei succedit, ideoque solida, quae rigida per hiemem erant et fluida nimis densata subito ac vehementer resolvit.

Hae

Hae et aliae tempestatum mutationes in nostra planitie, a montosis locis remota, omnino attendendae sunt, cum nimis varient et subito saepe se invicem excipiant. Etsi vero hae vicissitudines atmosphaerae universales in causis morborum vernalium definiendis negligendae non sunt, partiales tamen majorem medici attentionem postulant.

Inter eas causas, quae jam hieme et multo magis, vere appropinquante, morbos excitant, eosque, etsi non semper, maximam tamen partem epidemicos reddunt, conclavia nimis calefacta et cura nimia obvelandi corpus vestimentis pelliceis et aliis id genus, calorem nimium foventibus integumentis, referenda sunt. Quotiescunque enim intramus conclavia sanorum non minus, quam aegrotantium, calorem sentimus, qui fervorem climatis aestivi Africani propemodum aequat et quanquam hic error sexcenties indicatus est, raro tamen vel nunquam corrigitur, cum hominibus, molliori vitae assuetis, nihil suavius accidere posse videatur, quam si ex frigida vel humida aeris temperie reversi, in conclavi calefacto caloris sensu afficiantur. Atque hi praecipue sunt, qui, diu in calore immoderato versati, negotiorumque causa aeri frigidiori et humido rursus expositi, de intenso frigore magnisque

M m

inde



inde ortis molestiis conqueruntur, licet alii, qui ejusmodi aeris vicissitudines fugiunt, et caloris conclavium et aeris externi aliquod aequilibrium servant, his repugnant, et moderatum frigus esse contendunt.

Non levis est error feminarum nostrarum, in quem etiam infantes inducunt, quod, dum domi sunt, caput, corpus et crura pelliceis vestibus obvolvunt et muniunt, contra si in publicum et saepius in loca, aeris perflatui exposita, prodeunt, a vi aeris laedentis se non defendunt, sed vestibus, hiemali frigori non accommodatis, utuntur.


Si diaetae erroribus perstringendis diutius immorari placeret, alias nec leviores morborum vernaliū causas possem detegere, cum in universū vitae genus hiemale a vernali et aestivo maxime differat, nec semper constantibus his tempestatum varietatibus accommodetur: sed quia tractatio nostra a fine suo nimium recederet, de victu et potu tantum nonnulla proponam. Ac primum quidem victus ratio per hiemem saepe durior est, carnes etiam sale conditae et fumo induratae, pisces durioris carnis, frigore exsiccati, olera et legumina viscidiora et flatulenta, fructus horaei subacidi et non nihil adstringentes et alii digestionem validiorem exigentes,

cibi

cibi in mensis nostris apponuntur. Ad hos cibos recte digerendos exercitationibus corporis opus est, sed eae, ut constat, maxime negliguntur, quamquam certum est, hac ex causa multos ex plebejis, duro victu nutritos, sanitatem egregie tueri. Ad hujus rei neglectum accedit et alia noxa ex potu calido, quo nostri crebrius utuntur, quam alio tempore, propterea quod aestate in potu frigido refectio- nem quaerunt.

Ex his aliisque causis, quas fusius commemora- rare non attinet, abunde patet, cur vernali tempore corpora in universum varia ratione ad morbos dispo- nantur, qui tamen non nisi sporadici frequentiores dici possunt. Neque vero reticendus est communis error, per quem multi tum temporis labuntur, dum cu- ram prophylacticam vernalem jam mense martio suscipiunt.

Sentiunt profecto, sub primo aurae benignae afflatu, aliquam infirmitatem, quam plethorae col- lectae et spissitudini sanguinis, nec non coacervatis in primis viis impuritatibus adscribunt. Alii igitur consuetum medicamentum purgans et pilulas, saepe aloes et drasticonum medicamentorum stimulo effi- caces, sumunt, alii sanguinis evacuationem verna- lem citius instituunt et in hac re saepe medici con-



filio non utuntur, sed consuetis medendi rationibus inhaerent, cum tamen haec humorum correctio ab accuratiori diaeta deberet initium capere, antequam ad alia artis auxilia accederent. Perverfa igitur hac medendi ratione faepius cacochymiam variam, in primis et fecundis viis latentem, tantummodo movent, non promovent. Alii, quod pejus est et in robustis tantum et succiplenis hominibus interdum ex voto cedit, coactis per regimen externum et medicamenta sudoribus, humores vehementius movent et acrimoniam, spontaneis forte motibus et perspiratione vernali facile evolvendam et eliminandam, intensis his motibus augent, ut vel subito acutos morbos incitet vel augeat, vel subinde chronicis futuris ansam praebeat. Cum igitur et has ob causas, morbis sporadicis vernali tempore frequentioribus occasio detur, maxima cura medicorum eo dirigatur, ut, vere appropinquante, in has dispositiones corporum inquirant et, ut semper debent, consiliis dieteticis primum, postea etiam medicamentis quibusdam lenioribus, humores non tantopere exagitantibus, amicis suis succurrant, quo vernalis aurae benignitatem blande et cum commodo experiantur.

Ab instituto nostro alienum est, censuram curationum vernalium, quae porro mense maio et junio
fusci.

fufcipiuntur, addere. Plantarum vernalium fucci expressi, lac aut serum lactis et variae aquae minerales in cacochymiarum lente obrepentium curationibus magnam vim habent, dummodo constitutioni sanae et morbosae hominum accommodentur: Sed plures consuetudinis vi abrepti, hanc vel aliam curationis rationem eligunt, quam amicorum suafu, in quorum consortio esse cupiunt, commodam arbitrantur; et quoniam medici nonnunquam, qui in his curationibus accuratam diaetae rationem urgere debent, vel hoc officium negligunt, vel minus obediens aegros inveniunt, causis praedisponentibus non recte expensis, vel occasionalibus aliis simul admissis, morbi saepe leviores futuri ejusmodi curationibus non raro exasperantur. Unum modo hujus rei exemplum proferam. Inter causas febrium, praecipue intermittentium, abusum aquarum mineralium proposui *), experientia crebriori edoctus, per has aquas saepe saburram primarum viarum tantum agitari et pro differentia aegrorum vel febres intermittentes tertianas, salutes effectu suo, moveri, vel incompletis motibus pessimas quartanas et quotidianas vel duplicatas excitari, quae salutarem fontium medicatorum usum minus commendare videntur.

M m 3

Etsi

*) in Instit. Med. clinicac. §. 72.



Etsi vero plures morbi ex causis variis, per hiemem admissis, ex circulatione sanguinis et elaboratione humorum, minus expedite succedentibus, et ex minus accommodata prophylaxi leviorum morborum oriuntur, brevi tamen transeunt et a multis patienter feruntur. Febres nimirum catarrhales sic dictae, rheumatismis, vagis capitis doloribus aliisque symptomatibus, utpote levioribus vitae incommodis stipatae, sudoribus matutinis, urina cum sedimento, facile subsidente, gravedine, coryza et tussi, saepe etiam diarrhoeis solvuntur et quanquam in his etiam interdum medici cura opus est, tamen, naturae motibus recte observatis et directis, brevi tolluntur. Sunt autem nonnunquam tempestatum variantium vicissitudines et aegrorum quorundam dispositiones, quae non tam consuetos, quam singulares quosdam morborum progressus efficiunt, de quibus nunc breviter exponam.

Febres quidem, motibus concitatis, humorum dyscrasiam evolvere et dissipare, non solum leviores continuae benignae, sed etiam intermittentes tertianae regulares evidenter confirmant. Interdum vero vis materiae morbosae ne tanta quidem est, ut cordi resistere et motus auctiores in systemate sanguineo, ideoque veram febrem, excitare queat, interdum

terdum etiam solidorum laxitas et inertia in causa est, ut humores non satis agitentur, resolvantur et ad colatoria organa deriventur, sed stases potius in variis partibus contextus cellulosi et in seroso lymphatico potissimum systemate subsequantur, quae vel lente dissipantur, vel chronicis morbis occasionem suppeditant.

Attendendum quidem hic est ad erysipelaceos tumores, qui interdum totum corpus afficiunt, illudque rubore vel universali vel in latas areas expanso tingunt, accedentibus simul variis exanthematibus, tanquam in scarlatina et urticata febre; alio autem modo oedematosos et erysipelaceos tumores partiales exurgere videmus, qui totum caput et confinia colli vel simul vel successive occupant, qui interdum in extremitatibus observantur, interdum vero in aliis corporis locis, ubi non tantum cinguli instar in abdomine, sed aliis quoque in partibus conspiciuntur. In his enim omnibus oedema cum rubore, rubor particularis cum pustulis variae indolis apparent. Pustulae vero variam speciem referunt, siccae nonnunquam sunt et ad modum sabuli secedunt, tenui albo sero vel flavo ichore nonnunquam scatent, interdum vero



in maculas gangraenosas, per cutim ad contextum cellulosum penetrantes, convertuntur.

Sed nimis longum sit, excretionum cutanearum cum febre leniori incedentium, quae quidem per metastasin eo delatae sunt, historiam pertexere; sunt enim utplurimum mitiores, quae, ut aliae febres catarrhales, vernali tempore observatae, brevi transeunt et, dummodo, viribus vitae subsistentibus, blando regimine excipiantur, sine alio ferme, quam cuticulae desquamatione, incommodo finiuntur. Jam quoniam constat, febres has oedematofo-erysipelaceas interdum variis de causis exasperari, id doctrinam nostram quodammodo declarabit, si et de gravioribus quaedam commemoravero.

Docet experientia, particulares saepe metastases, in faciem, collum et universum caput directas, gravioribus symptomatibus esse stipatas. Acres enim humores, febre moti, copiosius ad caput ducuntur, propterea quod vasorum insignis copia humores ad illud transfert. Haud raro itaque in his febris vehementer intenditur, quam temperantia acida et nitrosa non cohibent, sed venaesectio eaque repetita sanguinis moti impetum refrenare debet. Accedunt enim interdum deliria, quae phrenitidem vel mentiuntur, vel eam, venaesectione intermissa, inducunt.

cunt. Inprimis vero angina molesta est, quae, quamquam catarrhosa videtur, nec inflammationem faucium secum habet, tamen ob tumorem insignem et vehementem sanguinis impetum suffocationis metum affert.

Nequaquam autem volo, ut tantum morbi acuti impetus refrenetur, sed id tum demum fiat, cum magna vis materiae morbosae ad caput translata est, motus tamen subinde cohibentur, atque chronica etiam mala remanent, cujus rei exemplum haec morbi historia esto.

Vir atrabilarius, hypochondriacis insultibus saepe exagitatus, ob aeris intemperiem, quam negligentius admiserat, febre catarrhali et simul tumore capitis oedematoso erysipelaceo affectus tenebatur. Medicus, qui hujus aegri curam habebat, jam in ipso morbi hujus ingressu perversam ejus indolem ex dispositione aegri metuebat, inprimis cum sciret, haec incommoda a venerea infectione proficisci, cui malo in juniore aegrotantis aetate mercurialibus minus recte fuerat occursum a medicastis, quibus praedisponentibus causis hanc morbi catarrhalis gravitatem adscribebat. Equidem in auxilium vocatus, ex signis collectis cognovi, languorem febrilem cardiacis suslinendum esse et tena-



citatem atrabilariam simul resolventia medicamenta poscere. Inde quidem in universo humorum circulo conveniens vigor excitabatur: sed magna vis morborum humoris, in caput coniecta, ita urgebat, ut hoc vehementer tumeret, palpebris inprimis turgidis et clausis, quibus aliisque partibus faciei non pustulae discretae, sed magnae bullae inhaerebant, in quibus ichor acris et flavus in contextum cellulosum descendebat et impura ulcera relinquebat. Chirurgus in his curandis et depurandis per aliquot hebdomadas operam graviter adhibuerat, cum iis exsiccatis et cicatrice clausis et ophthalmia etiam, quae inde orta erat, idoneis remediis dissipata, amaurosis in oculo dextro relicta cognoscebatur, quae nullam medelam admittebat. Paucis annis post hic aeger, anevrysmate aortae rupto, repente periit.

Superiori anno cum vernali tempore vicissitudines atmosphaerae, ex humiditate nimia in calorem transirent, quem crebriora refrigeria excipiebant, similibus oedematosis cum erysipelate conjunctis capitis tumoribus occasio data est. Etsi vero hi non nimium pertinaces erant et regimine dietetico et blandis resolventibus medicamentis cedebant, passim tamen usque ad julium mensem nonnullos vexabant.

Placet hic quoque commemorare tumores oedematofos in collo praecipue conspicuos, quos sub initium anni 1767 crebrius observavimus. Autumno enim 1766 usque ad mensem novembrem nimis benigna et vernalis quasi aura flabat, quam tamen subito vehementissimum frigus sequebatur. Verum, mense jam decembri, antequam frigus valde urgeret et sub initium anni 1767, ubi subito rursus temperata aeris humidi et calidi indoles corpora afficiebat, insolitae hae vicissitudines tempestatum catarrhalibus morbis variis occasionem dabant, ex quibus praecipue congestiones feri ad collum et oedemata externa inde nata annotanda putamus. Ut plurimum tantum contextus cellulofus subcutaneus intumuit et tumor, in uno latere ortus, in alterum transit. His vero tumoribus, quod caput non magnopere, sed collum potius occupabant, erysipelas rarius accessit, idque nunquam pustulis obfitum. Quamquam vero in nonnullis glandulae colli conglobatae simul intumescebant, parotidum tamen et glandularum maxillarium tumores nunquam nobis animadversi sunt et, si quas anginas catarrhofas excepero, quae sine oedemate, ad collum nato, oboriebantur cum oedemate externo, faucium tumor erat nullus.

Elegi-



Elegimus quidem in his morbis sanandis, quod vehementiora symptomata non conjuncta habebant, resolventia leniora interna amaro-salina et infusa et decocta ex herbis et radicibus demulcentibus et discutientibus, nunquam tamen recte curari poterant, nisi aut clysmatibus aut lenioribus laxantibus mannatis, rhabarbarinis et salinis, addito nonnunquam stimulo fennae, humores quodammodo derivarentur. Externa medicamenta tumoribus discutiendis non conveniebant. Emplastra de meliloto, malacticum et alia emollientia, tumoribus durioribus imposita, pustulas excitabant, saepe etiam facculi, pulveribus ficcis discutientium herbarum farcti, similem molestiam creabant, tumore tamen non discusso, sed ad vicina loca propulso.

Singularem vero morbi transitum in quibusdam adolescentibus observare licuit. In his enim, tumoribus, vel ex usu medicamentorum imprimis externorum discussis, vel haud raro sponte evanescentibus, ad scrotum et interdum ad inguina tumores ejusmodi oedematosi, subito exorti, deprehendebantur. Fateor, hanc rem nonnullam suspicionem venerei contagii, clanculum suscepti, nobis movisse, verum cum, attentione adhibita, nihil aliorum signorum extaret, quibus haec morbi indoles confirmaretur et similis
 eventus

eventus et in pueris nonnullis observaretur, singularem hanc materiae viscidae catarrhofae metamorphosin esse cognovimus, imprimis propterea, quod hi tumores, leni calore foti, sine ulteriori incommodo post paucos dies evanescebant, quanquam nulla critica signa in urina apparebant, sed lenta tantum morbi discussio cum facili virium instauratione subsequerebatur.

Non ab re esse videtur, considerationem morborum vernalium 1768 observatorum hic subungere. Erant autem hi superioribus non graviores, sed aegri, curae meae traditi, consuetis febrium catarrhalium paroxysmis agitati, sine valida crisi, idoneo regimine observato, convalescebant. Hoc tamen ut singulare quid observavimus, oedemata pedum et aliarum quoque partium, quid quod faciei et colli, crebriora evenisse. Neminem medicorum latet, post febres intermittentes validas, oedemata crurum et rarius anasarcam succedere et hujus rei causam in imbecillitate universali et partiali interdum laxitate, quae per morbum antecedentem inducitur, positam esse. Et cum hoc in iis potissimum eveniat, quorum curatio, salinis resolventibus copiose datis, nimium protracta est, dubium non est, quin in nostris quoque morbis imbecillitatem attendi oporteat.

Infan-



Infantes inprimis morbo correpti, iis tumoribus in universo saepe corpore affecti sunt, manifesto sane indicio, debilitatem hujus mali causam esse. In feminis quoque, praesertim imbecillibus, oedemata pedum longius subsisterunt, quam in viris, quorum vita pluribus corporis exercitationibus continetur.

Etsi vero in his morbis regimen diaphoreticum et medicamenta, sudorem excitantia, plerumque indicata reperimus, melius tamen respondet usus leniorum laxantium, quibus feri stagnantis resorptio et discussio juvatur. Verum ut ego quidem arbitror, nunquam in his solis subsistendum est, sed roborantium, inprimis corticis peruviani usu laxitas simul corrigatur. Cogitavi quidem de diureticis, sed indicatio non successit, cum urina per morbum, quamvis interdum febrilis esset, non mutaretur, sed in naturali sua crasi persisteret.

Repetamus nunc observationem ex morbis epidemicis vernalibus anni 1759. Varias vicissitudines aeris, inprimis nebulae frequentiores abortae, nec ventis dissipatae, morbis vernalibus excitandis occasionem dabant, qui, etsi catarrhales erant, tamen singularis et frequentior accessus diarrhoearum morbum solvebat et in nonnullis, in quibus haec crisis
non

non accedebat, morbus, ictero superveniente, exasperabatur. Febris accessiones benignae erant, nec ullis gravioribus symptomatibus stipatae, in multis autem appetitus ciborum cum nausea et carniū fastidio conjunctus observabatur, ita quidem, ut, quanquam a causa catarrhali proficisci videbantur, magis tamen stomachicae, intestinales et biliosae appellari possint. Eas vero a saburra, in primis viis collecta atque jam mota, oriri, diarrhoeae spontaneae, tertio quartoque morbi die cum levamine accedentes, confirmabant.

Diarrhoeae, catarrhalibus morbis supervenientes, saepe serosae sunt, a sudore suppresso ad intestina converso, quae tum blando regimine diaphoretico excipiuntur, ne omnis vis morbi in intestina convertatur. Noster tamen morbus ab his differabat in eo, quod dejectiones alvinae magis biliosae reperiabantur, in primis cum ii, qui dejectionibus alvinis non levabantur, in icterum inciderent. Neque tamen unquam cognovi in his, iracundia concitata, bilem magis motam fuisse, quam causam alias in febribus biliosis saepe invenimus. Itaque non est dubium, in dispositis interdum febres catarrhales bilem movere et affluxum ejus et stimulum in primis viis excitare; quod si vero bilis commota
non



non effluat, spasmo viarum bilis inducto vel crasi sanguinis ad bilem generandam magis aucta, haec in sanguinem ita redundat, ut icteri causa sit.


Si itaque in imminentibus morbis catarrhalibus fastidium carniū et prostratio appetitus ciborum se exserunt, omnino colligimus, impuritates primarum viarum vel vomitorio medicamento protinus emovendas, vel si tormina ventris, materiam morbi in intestinis jam motam, indicant, stimulo salino mitiori, imprimis ex cremore tartari et rhabarbaro addito, versus inferiora promovendas esse. His enim auxiliis febris mitior redditur et dejectiones salutares morbum ex acrimonia evoluta graviozem futurum coercent et prorsus tollunt. Quod si vero haec evacuatio in principio neglecta, nec admodum necessaria visa fuerit et diarrhoea spontanea tamen movetur, ex effectu suo critica dicenda, indicatis jam laxantibus vel mannatis et aliis idoneis medicamentis ita juvatur, ut morbus sine ulteriori augmento transeat. Quod si denique, diarrhoea non protinus succedente, icteri signa apparent, morbus hic accessorius omnino mitior invenietur et saepe post viginti quatuor horas dissipabitur. Nos certe tunc temporis liquore terrae foliatae tartari et solutione rhabarbari aquosa largioribus dosibus exhibitis in-

sultus

sultus morbi sine accessu graviorum symptomatum dissipavimus.

Accidit autem mense martio 1759, id quod hac ipsa hieme crebrius observavimus, ut congestiones serosae, a vicissitudine tempestatum oriundae, quoniam nulla erant febre stipatae, tardius dissipantur. Nonnulla quidem prostant exempla, ubi horror quidam vespertinus noctu calorem et matutino tempore sudorem excitavit, ita, ut febres tales catarrhales unico paroxysmo finirentur. Verum in multis sine hac febre transitoria, vel post eam superatam, materia non prorsus discussa, sed metastatice mota, in variis corporis partibus subsistit et sine omni febre aegros diu excruciat. Adferamus exempla, quae his ipsis diebus nostram curationem postularunt.

Qui habitualibus doloribus arthriticis vexantur, quanquam regulares paroxysmos non experiuntur, vagis tamen articulorum doloribus afficiuntur. In pluribus vero aliis artus et dorsum rheumatismis ferme continuis, nunc quodammodo fixis, nunc vagis, detinentur. Nihil tamen frequentius observatur, quam congestiones materiae viscidae et acris ad dentes. Etsi vero haud raro dens cariosus causa est doloris persistentis, causa tamen occasionalis in tempestatibus variantibus vere quaerenda est, propterea quod




et vicinae partes et post dentes saepe evulsos tensionibus rheumaticis afficiuntur. Erysipelacei tumores capitis universi rarius animadvertentur, sed ad confinia frontis partes quasdam cutis, cum rubore obscuro et dolore exiguo turgentes, vidi, his tamen ad capillatam partem capitis magis, quam ad faciem extensis. Praecipue tamen ad auriculas tales tumores saepius conspiciuntur, ita etiam, ut in paucis sine erosionibus manerent, quippe quae in multis, acrimonia scatentibus, post aures observantur, in aliis serum acre ex meatu auditus excernitur. Similis certe indolis sunt congestiones catarrhales ad oculos, quae interdum quidem ophthalmias siccas cum pruritu, frequentius tamen humidas efficiunt, in quibus non verae tensiones et stases inflammatoriae arteriarum, sed magis tumor serosus cum venis membranae conjunctivae varicosis et rubicundis apparet.

Quod si igitur haec, quae modo disputata a nobis sunt, cum iis, quae superius de tumoribus oedematosis variarum partium commemoravimus, contulero, facile intelligo, cur congestiones haec serosae febrim vel prorsus non, vel in principio tantum conjunctam habeant; cur vel tum, cum sponte cessat, vel cum praeposito temperantium medica-



medicamentorum usu vel sanguinis missione et saepe nimia, supprimitur, materia morbi relinquatur, parum moveatur et, si etiam malignae indolis non est, tum demum lente dissipetur, cum aura vernalis magis benigna et constans, universum humorum circulum juvat et elaborationem humorum liberio-rem reddit. Perspicio et illud, quare interdum et quidem tum, cum materia acris in humoribus abundat, ea vel ex sua indole, vel regimine magis calido, vel medicamentis acrioribus evolvitur et vehementius urgetur, febres continuas et interdum malignas excitet; cur denique in senibus saepe ad nobiliores partes, imprimis encephalum delata materia acris apoplecticis insultibus et catarrhis suffocativis occasionem praebet.

Si nunc potissimum congestiones illas leviores, diu molestas, consideramus, in universum quidem ad imbecillitatem corporum, ex vitae genere in multis antea jam natam, provocare possem, quam non tam in deficiente fibrarum elasticitate, quam potius in virium universalium, circulationem dirigentium, inertia sitam cognoscimus et cujus causae in vita molliori et contentione studiorum, inter nostros saepe observatae, praecipue se offerunt. Verum propterea ratio elaborationis humorum nostrorum



nequaquam debebat attentione medici indigna judicari, nam lentiores et stases humorum, in systemate seroso lymphatico natae, cordi non ita resistunt, ut circulum humorum universalem excitent et febrem commoveant, sed, cum resorptiones humorum in minimis vasis, vel exiguae sint, vel saepe impeditae, eorum copia corpora subinde ad chronicos morbos disponit. Quod si vero acrimonia, in humoribus latens, interdum in laxioribus corporibus, multo magis autem in strictioribus tensiones et spasmos et inde vagos saepe dolores in minimis partibus excitat, febriles motus inde suscitari posse intelligo: sed hi inconstantes sunt et vagi, nec possunt unquam, nisi prudentis medici auxilio sustineantur et gubernentur, perversas humorum mixtiones penitus resolvere et dissipare.

Proinde medicus, ad dispositionem sanorum et aegrorum corporum attentus, quaecunque ab arte possunt suppeditari auxilia, in moderamine febris adhibet. Neque enim ea vel calidiore regimine, vel medicamentis, sanguinis motum excitantibus, augenda, neque saepe transitoria, nec ultra modum intensa febris temperantibus medicamentis et sanguinis missione praepostere supprimenda est, sed, ratione habita dispositionis aegrorum et idiosyncrasiae,

ad

ad primas vias, ad sanguinis motum et ad sero-lymphatici et nervosi systematis indolem simul respiciendum est, ut internae vires in morbis imminutibus et ex tempestatum vicissitudinibus tanquam causis occasionalibus saepe natis dijudicentur et in suo demum progressu recte dirigantur.

Haec medici attentio etsi paucis verbis sub finem tractationis absolvi nequit, nonnulla tamen in universum addere placet, ne vagae hae observationes, quae pathologiam morborum vernalium illustrant, sine attentione ad eorum curationem propositae videantur, atque praeter ea, quae passim adspersa sunt, praecipua therapiae capita tangam et doctrinae ejus generali accommodabo.

Purgantia quidem prophylactica remedia, ut semper, sic in morbis, praecipue vernalibus, imminutibus vel jam evolutis ex dispositione hominum dijudicanda sunt. Neque tamen hic solum ad rigiditatem et laxitatem corporum in universum, itemque ad siccitatem et humiditatem tubi intestinalis, sed simul ad indolem saburrae foeculentae, in primis viis collectae, respiciendum est. Pituita viscida quidem salina, amara et gummi saponacea medicamenta resolventia postulat, his tamen non diu utendum est, sed ea, ubi paullo mobilior esse coe-



pit, valido purgante eliminari debet. Nec biliosa vel plus minus putrida materia, nausea et oris amaro se prodens, nimis resolvenda et lente promovenda, sed, vel vomitoriis, ad dispositionem corporis accommodatis, ejicienda, vel tamarindorum pulpa et manna, salino vel alio stimulo adjutis, protinus expellenda est, ne nimis resoluta ad secundas vias derivetur. Hoc itaque monitum multo magis attendendum est, cum materia biliosa acris et viscida jam ad secundas vias transit et, febre mota, agitur; saepenumero enim observatum est, purgantibus validioribus et resinosis potissimum acrimoniam, in primis viis latentem, cum non rite esset subducta, ita agitatam fuisse, ut febribus intestinalibus et purpurae generandae occasionem daret, imprimis si simul regimine calido sudores fuerint commoti.

Multi igitur medici, hunc errorem cognoscentes, in contrarium inciderunt, ut, cum in catarrhalibus febribus evacuationes alvinas in universum noxias pronuntiarent, quod pustulas jam excretas, vel eam, quam subesse existimabant purpuram, in progressu suo impediri arbitrabantur. Inde enim factum est, ut vel obstructions alvinas, anxietatibus etiam hypochondriacis praesentibus, per plures
dies

dies tolerarent, vel etiam tum, cum diarrhoea movebatur, quae saepe salutaris erat, aut roborantibus aut opiatīs medicamentis eas compescere anniterentur, id quod in causa fuit, ut regimine calido in conclavibus, stragulis ac potu et alexipharmaca medendi ratione inprimis accedente, sudores in cruditate morbi orirentur, qui acrimoniam in cutem derivarent et purpuram generarent. Medici itaque prudentes, imminente jam febrili languore vel febre ipsa jam mota, foeculentae saburrae per clysmata viam aperiunt, lenia salina, mannata et tamarindinata purgantia exhibent, in diarrhoeis jam obortis rhabarbarina cum cremore tartari et salibus mediis, vel interdum cum antacidis terreis juncta eligunt, ex qua vera medendi methodo purpurae vernaes cum febre continua acuta, inter nostros antehac frequentiores, nunc oppido rarae et scorbuticae etiam, quae sine febre pustulas cutaneas efflorescere faciunt et per aestatem saepius durant et augentur, minus molestae sint.

Quanquam vero robusti homines, duro victu nutriti, drastica aloetica et resinosa purgantia facile ferunt et interdum exigunt, tamen et in his catharhalibus febribus motis, non nisi accurato examine reliquorum symptomatum instituto, propinari de-



bent. Saepius in robustis his corporibus intermittentes febres a nausea et vehementi horrore initium faciunt, in quibus vomitoria, imprimis ea, utilia sunt, quae post ejectionem saburrae viscidae et biliosae ex ventriculo et intestino duodeno, etiam reliquum canalem blandis stimulis ad continuandas evacuationes alvinas disponunt. Haec vomitoria, quoniam eorum usu vires convelli arbitramur, in imbecillis frequenter negligimus, atque fateor, me hac in re non semel errasse, quod saburram, per superiora facile movendam, lenioribus tantum evacuationibus ad inferiora duxerim et ita morbum protraxerim. Etsi vero nausea et amaror oris imprimis vomitoria postulat et fomes morbi uno saepius medicamento ejicitur, perpendendum tamen omnino est, acrimoniam hanc, tum, cum in secundis viis jam evoluta et mota est, hic non coerceri, nec ad ventriculum derivari et per eum sine noxa aegri ejici posse, sed potius diarrhoeis spontaneis obortis, vel lenioribus alvi purgationibus excitatis, in excretionem melius adjuvari. Cum enim certum sit, acrimoniam in habitu cutaneo, leni sudore dissipandam, regimine neglecto, ad intestina converti et saepe diarrhoeis ferolis et interdum biliosis promoveri, confectum etiam esse arbitror,

tror, eandem nec sudoriferis, nec aliis evacuantibus avocari, sed lenioribus purgantibus juvari debere.


Quaquam vero sanguinis missio in vernalibus morbis ad vehementiam febris compescendam rarissime indicatur et prophylactica etiam; cui plures ex nostris temere adsueta sunt, saepe post morbum discussum differri et potest et debet, ne, evolutione globulorum sanguinis celeriore reddita, acrimonia latens nimium evolvatur, tamen multae existunt causae, quae vernali tempore tempestivam sanguinis missionem postulant. In iis enim, qui habitualibus haemorrhagiis nimium enervantur, inprimis si haemoptoici sunt, impetus sanguinis inordinatus moderata venae sectione avertendus est, ne, febrilibus motibus excitatis, sanguinis massa nimis turgescat et vehementi impetu ad varias has partes, per quas haemorrhagia procedit, feratur. Sunt etiam alii, qui denso nimis sanguine praediti, ob plethoram veram sanguineam, quae per hiemem nata est, multis incommodis afficiuntur. In his certe sanguinis missionem prophylacticam citius instituire convenit, quam in aliis, qui ad plethoram obesam dispositi sunt et tum demum, cum vernalis calor humores magis evolvit, cum primae viae



idoneis medicamentis purgantibus liberae redditae sunt, cum alia colatoria abundantiam feri acris subinde dissiparunt, venae sectione ad robur vasorum non solum in universum, sed praecipue in resorptione humorum ex seroso lymphatico systemate instaurandum, opus habent.

Prudentis medici semper est, eas vias, quas natura in corrigendo lentore hiemali et acrimonia interea collecta et aucta dissipanda eligit, sequi, quo has excretionem regimine et medicamentis non quidem urgeat, sed tantum juvet. Quod quidem hoc diligentius attendendum est, cum imbecillitas, quae nostris aegris ferme semper propria est, nec coctiones materiae morbi vehementes, nec crises subito per unum alterumque colatorium tantum absolvendas, sed blandas modo lyfes, seu dissipationem humorum morbosorum subinde factam, admittat. Quam ob rem consultius est, omnes vias, per quas cacochymia, varie collecta, dissipari potest, regimine diaetae liberas servare et, si opus sit, medicamentis idoneis secessum ejus moderari.

Totus hujus rei cardo versatur in moderamine febris, de quo pauca adjicienda puto. Febris moderata est concitator humorum motus, quo evolutiones



tiones materiae morbosae non solum juvantur, sed et noxiae particulae ad colatoria ducuntur, haec ideoque praepostere supprimenda non est. Si enim motus cohibentur, humores male mixti non recte evolvuntur, nec ad colatoria ducuntur, sed in contextum cellulosum, vel sub cute et inter musculos positum, vel glandulae fabricam densius cingentem, conjiciuntur, quid? quod ad ipsam viscerum et glandularum fabricam transeunt et eam lente obstruunt. Vidimus in morbis vernalibus et supra descripsimus, tumores saepe sine febre existere: et morbi glandularum, qui nobis nunc in curationibus nostris multum molestiae afferunt, nec, ut antehac, in infantibus et pueris, motu non satis exercitatis, obveniunt, sed saepe vegetos juvenes et adultiores feminas afficiunt, satis confirmant, humores lentos et acres in corporibus his imbecillis saepius moveri, sed non penitus promoveri.

Exigit haec res nostris potissimum temporibus accuratiorem considerationem, cum metastases morbosae non tam ex climatis et vitae generis ratione, sed ex dispositione corporis universa et praeterea ex varia medendi methodo pendeant. Etsi igitur passim in adversariis nostris monita, eo pertinentia, adspersa sunt, severius tamen examen, per accuratas



tas morborum observationes confirmatum, institui debet, si metaschematizinos morborum recte definire et chronicorum morborum genesin ex acutis neglectis vel perperam curatis declarare velimus.

Et in resolventium et roborantium medicamentorum selectu ad evolutiones vernaes juvandas insignis medici diligentia requiritur. Etsi enim lentor humorum per hiemale tempus, in iis potissimum, qui vitae sedentariae dediti sunt, contrahitur, tamen uti sanguis rubicundus in his non ita densatur, quemadmodum in aliis, qui corpora sub frigido coelo exercent, sic viscidum etiam in viis seroso-lymphaticis non admodum tenax est et spissum, sed cum aliqua tenuitate conjunctum, quoniam cum solidarum partium inertia, moderata humorum densitas, quae sanitati propria est, non efficitur. Hic salia media, quae et in lentos humores penetrant et solida stimulant, resolvendi effectum recte absolverent, nisi continuato eorum usu, tum in primis viis, tum in universo corporis systemate laxitas induceretur, atque, tenui seroso humore expulso, simul viarum molesta siccitas remaneret. Extracta quidem plantarum amararum, quae sale abundant et aliqua roborandi vi praedita sunt, quaeque praeter resolvendi virtutem etiam siccandi vim habent,




habent et propter insuavem saporem, displicent, sed dummodo recte seligantur et cum gummatibus et gummi resinosis, nec non cum sapone conjungantur, nec ultra modum continuantur, humores lente-scentes et acres ita disponunt, ut subinde per colatoria secedant et catarrhales morbos in universon ad blandas solutiones reddunt idoneos.


Succi, qui plantis vernalibus exprimuntur, sub-amaris puta, inprimis lactescentibus, si vel per se propinantur, sero lactis postea hausto, vel tenuibus carniurn jusculis excipiuntur, in imbecillis etiam blandam resolvendi vim habent; robustioribus vero infusa et decocta, praecipue ex radicibus tonicis et resolventibus v. c. carlinae, pimpinellae albae et saponariae, non sine fructu propinantur. Essentiis et tincturis spirituosis, quibus in mixturis concentratis anticatarrhalibus et resolventibus antehac semper ferme usi sumus, quod videbatur nostris aegris magis placere concentratis, quam diffusis medicamentis, rarius nunc utimur et helenii radicis vel herbae scordii aliaque extracta, in aquis destillatis soluta, propinamus. Neque vero negandum est, imbecilles, victu molli et potu calido saepe nimium utentes, concentrato spirituoso laedi, quod non tantum coagula lymphaticorum humorum, sed etiam
stimu-



stimulum exsiccantem in solidis relinquit, in robustis tamen et corpus satis exercentibus hominibus, qui potu spiritioso assueti sunt, essentiis scordii, pimpinellae, helenii et composita essentia alexipharmaca STAHLII, ut mixturis resolventibus tonicis, in morbis catarrhalibus lentorem humorum corrigimus et acrimonias quoque moderato sudore discutimus. Quod si etiam hos diuresi magis juvare contendamus, tunc tincturae alcalinae tartari et antimonii varia ratione, sed recte praeparatae et in se et cum radicibus resolventibus digestae, viscidum non solum resolvunt, sed etiam per renes apte subducunt.


Cum autem in imbecillis etiam, in quibus tenuitas humorum est, lentoris viscidi indicia non desunt, atque vasa debilia, quoniam sanguinem et humores non recte densare queunt, resolvente medicina magis debilitantur, multi mox ad usum roborantium accedunt et imprimis cortice peruviano utuntur, existimantes, ex eo potissimum nullam noxam oriri, quod amaritiem resolventem, roboranti virtuti junctam, habeat; Verum tenendum est, sicca corpora saepenumero non ferre hanc medendi rationem, quae interdum in succiplenis utilis inventa est. Etenim non laxitas corporis, sed causa laxitatis,







xitatis, in viscido collecto posita, prius removenda est. Quemadmodum igitur in intermittentibus febribus post resolventia et evacuantia, recte exhibita, vis solidorum per se restituitur et exercitatio corporis sola oedemata forte relicta facile discutit, sic etiam in multis catarrhalibus morbis, vernali tempore frequentioribus, resolventia amara et tonica, blandis evacuantibus, imprimis per alvum, interpositis, omnem curationem absolvunt et robur elasticum et vitale rursus instaurant, atque in universum constat, exercitationem corporis, vernali tempore in aere libero susceptam, robur partium magis confirmare, quam medicamenta roborantia, licet selectissima.



CONTENTA
IN HAC PARTE.

- I. Dissertatio de evolutionibus corporis animalis sani et
aegri in universum pag. 387
- II. Commentatio de morbo et morte amatae conjugis p. 407
- III. Oratio de dissensu medicorum in commodum artis
salutaris convertendo p. 452
- IV. Dissertatio de topicorum medicamentorum usu in va-
riolis p. 473
- V. De vi cardiaca opii disquisitio p. 504
- VI. Commentatio de suctione vulnerum pectoris cum de-
lineatione tubuli ad hos usus apti p. 517
- VII. De sulphuris venerei viribus et efficacia in curanda
epilepsia habituali Auctore I. E. GREDING p. 530
- VIII. De morbis epidemicis vernalibus observationes sin-
gulares p. 543

